

01. A política nacional de saúde mental, regida pela Lei 10.216, enfatiza que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental:


- (A) receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento.
- (B) ser tratada sempre em serviços comunitários de saúde mental.
- (C) ter acesso à internação em instituições com características asilares.
- (D) ter uma sala específica para atendimento aos portadores de transtornos mentais na unidade básica de saúde.

02. A internação psiquiátrica deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. A conduta descrita está relacionada à internação do tipo:

- (A) voluntário.
- (B) involuntário.
- (C) compulsório.
- (D) determinado.

03. O enfermeiro recebeu um relatório técnico sobre a situação do sarampo no estado do Ceará. No presente relatório, há o seguinte gráfico:

Figura 3. Casos confirmados de sarampo, incidência e percentual, por faixa etária, Ceará, 2013 a 2015*.



Fonte: SESA/COPROM/NUVEP/SINAMWEB. *Atualização em: 18/09/2015. Dados sujeitos à revisão.

Após a análise, o enfermeiro convocou os agentes comunitários de saúde para relatar os achados do relatório para uma efetiva investigação epidemiológica. O resultado descrito baseado no gráfico acima revelou que:

- (A) a maior incidência do sarampo foi em menores de 1 ano.
- (B) o maior percentual do sarampo foi na faixa de 20 a 29 anos.
- (C) a faixa etária de 15 a 19 anos merece receber uma atenção especial, pois foi o segundo maior percentual de casos.
- (D) é possível verificar uma relação diretamente proporcional em todo o gráfico, pois, na medida em que a idade aumenta, a incidência da doença também é elevada.

04. Mesmo após a interrupção da transmissão autóctone do vírus do sarampo, é importante a manutenção do sistema de vigilância epidemiológica da doença. Assim, um caso autóctone é definido como sendo:

- (A) o caso que, segundo informações disponíveis, não se apresenta epidemiologicamente relacionado a outros já conhecidos.
- (B) o primeiro, entre vários casos, de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.
- (C) o caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência.
- (D) caso decorrente de uma transfusão de sangue ou outra forma de inoculação parenteral.

05. Um paciente procurou o enfermeiro para solicitar ajuda diante da prescrição médica, informando que sua glicemia capilar foi de 350mg/dL. A prescrição é a seguinte: administrar 6UI de insulina, uma vez ao dia. O enfermeiro,

ciente de que, na unidade, o frasco disponível de insulina regular é de 100UI por ml, orientou que o paciente devesse aspirar:

- (A) 0,006ml.
- (B) 0,06ml.
- (C) 0,6ml.
- (D) 6ml.

06. O enfermeiro recebeu a seguinte prescrição para ser executada: administrar soro glicosado no paciente, 1500ml a cada 12 horas. O gotejamento para 24 horas que a enfermeira deverá fazer é:

- (A) 21 gotas por minuto.
- (B) 42 gotas por minuto.
- (C) 63 gotas por minuto.
- (D) 125 gotas por minuto.

07. A pedagogia libertadora de Paulo Freire é considerada uma importante metodologia nas estratégias de educação em saúde. Essa proposta metodológica visa:

- (A) ao depósito e à transferência, por meio de palestra unidirecional, de valores e conhecimentos.
- (B) a um diálogo verticalizado em que o educando é um ser passivo.
- (C) à construção da emancipação do sujeito para o desenvolvimento da saúde individual e coletiva.
- (D) a uma relação hierarquia entre um que sabe e outro que não sabe.

08. A Portaria nº 2488, de 21 de outubro de 2011, descreve as atribuições dos membros das equipes de atenção básica, sendo contribuição comum a todos os profissionais:

- (A) realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente, no âmbito da unidade de saúde.
- (B) planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe.
- (C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
- (D) cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.

09. Com relação à composição da estratégia de saúde da família, segundo a portaria estabelecida para esse fim, é verdadeiro afirmar que:

- (A) o cadastramento de cada profissional de saúde deve ser apenas 01 (um) por ESF, com exceção somente para o profissional enfermeiro, que poderá atuar em no máximo 02 (duas) ESFs.
- (B) cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas, sendo a média recomendada de 4.000 pessoas.
- (C) se recomenda que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto menor o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.
- (D) a jornada de 40 (quarenta) horas deve observar a necessidade de dedicação mínima de 32 (trinta e duas) horas da carga horária para atividades na equipe de saúde da família.

10. Os núcleos de apoio à saúde da família - NASFs foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, da estratégia de saúde da família, bem como de sua resolubilidade. São vários os profissionais que podem fazer parte do NASF, **EXCETO**:

- (A) médico acupunturista.
- (B) médico veterinário.
- (C) fisioterapeuta.
- (D) médico traumatologista.

11. A vacina inativada contra poliomielite (VIP) está indicada para a imunização ativa contra a poliomielite causada pelos três sorotipos (1, 2 e 3). Seu esquema vacinal, de acordo com o novo calendário de imunização para Fortaleza/2016, é:

- (A) 2, 4 e 6 meses.
- (B) 2, 4 e 8 meses.
- (C) 2 e 4 meses.
- (D) 2 e 6 meses.

12. A vacina pneumocócica 10 (conjugada) tem um novo esquema: 2 (duas) doses aos 2 e 4 meses de idade e reforço preferencialmente aos:

- (A) 12 meses.
- (B) 15 meses.
- (C) 18 meses.
- (D) 24 meses.

13. A contraindicação é entendida como uma condição do usuário a ser vacinado que aumenta muito o risco de um evento adverso grave ou faz que o risco de complicações da vacina seja maior do que o risco da doença contra a qual se deseja proteger. Uma falsa contraindicação:

- (A) é a ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento da dose anterior.
- (B) são diagnósticos clínicos prévios de doença, tais como tuberculose, coqueluche, tétano, difteria, poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola.
- (C) é a história de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
- (D) são usuários que fazem uso de terapia com corticosteroides (dose imunossupressora) e devem ser vacinados com intervalo de, pelo menos, três meses após a suspensão da droga.

14. Marque a alternativa correta que corresponde às vacinas que devem ser administradas por via subcutânea.

- (A) Febre amarela e tríplice viral.
- (B) Hepatite e tríplice viral.
- (C) Meningocócica e febre amarela.
- (D) Varicela e meningocócica.

15. Uma criança de dois meses compareceu à sala de vacina para realizar o esquema preconizado para a idade. O enfermeiro explicou à mãe que ele iria aplicar três vacinas injetáveis (VIP, pentavalente e pneumocócica 10 valente), podendo ser realizada a aplicação nos seguintes locais, respectivamente:

- (A) vasto lateral da coxa esquerda, vasto lateral da coxa direita e vasto lateral da coxa esquerda.
- (B) vasto lateral da coxa esquerda, vasto lateral da coxa direita e deltoide esquerdo.
- (C) vasto lateral da coxa esquerda, deltoide direito e deltoide esquerdo.
- (D) deltoide direito, deltoide esquerdo e vasto lateral da coxa esquerda.

16. Acerca da sistematização da assistência de enfermagem, avalie as seguintes afirmativas.

- I. É composta pelo histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição e implementação da assistência e evolução de enfermagem.
- II. Em todos os níveis de atenção à saúde, a consulta de enfermagem deve ser desenvolvida de forma sistemática na assistência de enfermagem.
- III. Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas.
- IV. O diagnóstico de enfermagem, etapa da sistematização da assistência, é processo deliberado e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa ou

coletividade humana para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado.

Estão corretas as alternativas:

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II, III e IV.

17. No que se refere aos aspectos legais e práticos do cuidar, é atividade exclusiva do enfermeiro:

- (A) realizar cuidado de pacientes hipertensos, bem como realizar ações educação de saúde.
- (B) aplicar nebulização, enterocisma, enema, executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes e participar dos procedimentos pós-morte.
- (C) promover cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de morte.
- (D) realizar procedimentos invasivos e anotação no prontuário durante a realização de procedimentos.

18. Acerca do cateterismo vesical, avalie as seguintes afirmativas.

- I. Consiste na introdução de um cateter na bexiga com a finalidade de drenar urina; esse procedimento deve ser realizado, quando possível, com técnica asséptica.
- II. No cateterismo vesical de alívio, o cateter é introduzido com a finalidade de manter a drenagem contínua da urina nos casos de controle rigoroso de volume urinário.
- III. O cateter mais comumente utilizado é o de Folley, composto de látex com balão de retenção na extremidade.
- IV. Existem cateteres que são impregnados com antimicrobianos, como prata e nitrofurazona.

Assinale o item correto.

- (A) Somente as alternativas II e III estão corretas.
- (B) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
- (C) As alternativas III e IV estão corretas.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.

19. A mensuração da pressão arterial visa identificar possíveis alterações de normalidade e valores pressóricos. No que se refere à técnica da verificação da pressão arterial, assinale a alternativa correta.

- (A) Para a medida, deve-se obter a circunferência do terço inferior do braço. Após a medida, deve-se selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço.
- (B) Para estimar o nível da pressão sistólica, deve-se proceder à palpação do pulso braquial. O seu reaparecimento corresponderá à pressão arterial sistólica.
- (C) Para obter a medida da pressão arterial, deve-se inflar lentamente o manguito até ultrapassar 20 a 30 mmHg do nível estimado da pressão sistólica, obtido anteriormente pela palpação.
- (D) Para determinar a pressão diastólica, deve-se verificar o desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff).

20. Preparar o paciente para os procedimentos é uma das atribuições do enfermeiro. O profissional deve saber que a posição de Sims corresponde:

- (A) ao decúbito lateral.
- (B) à posição de Trendelenburg.
- (C) à posição de Litotômia
- (D) à posição de Fowler.

21. As úlceras por pressão são lesões geralmente causadas por um excesso de pressão em alguma parte do corpo. Avalie as alternativas relacionadas à prevenção e/ou tratamento dessas úlceras.

- I. Para aliviar a pressão, devem-se usar travesseiros ou almofadas de espuma, gel ou ar.
- II. A mudança de decúbito com frequência e o uso de cremes hidratantes, diariamente, nas regiões com proeminências ósseas irão colaborar para evitar o surgimento da úlcera.
- III. Massagens vigorosas em pacientes com risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão é prática importante para a vascularização da pele.
- IV. Pacientes que apresentam risco de desenvolvimento de úlcera por pressão necessitam de inspeção diária de toda a superfície cutânea, da cabeça aos pés.

Que item está correto?

- (A) As alternativas I, II e III estão corretas.
- (B) As alternativas I, II e IV estão corretas.
- (C) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.

22. Uma das complicações que podem ocorrer no período gravídico é a separação intempestiva da placenta do seu sítio de implantação no corpo uterino, antes do nascimento do feto, em uma gestação de 20 ou mais semanas completas. É correto afirmar que esta definição se refere:

- (A) ao Trabalho de parte prematuro.
- (B) a Rotura prematura das membranas placentárias.
- (C) a Placenta Prévia.
- (D) ao Descolamento prematuro de placenta.

23. É papel do enfermeiro identificar informações da gestante que podem indicar a necessidade de encaminhamento ao pré-natal de alto risco. Assinale a alternativa correta sobre possíveis fatores de risco.

- (A) Ganho ponderal inadequado, infecção urinária e anemia.
- (B) Doenças psiquiátricas que necessitam de acompanhamento, como psicoses, depressão grave etc.
- (C) Condições ambientais desfavoráveis e altura inferior a 1,45m.
- (D) Intervalo interpartal menor do que dois anos ou intervalo interpartal maior do que cinco anos.

24. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença que mais frequentemente complica a gravidez, acometendo de 5% a 10% das gestações, sendo facilmente verificada durante o pré-natal. No que se refere a essa complicação, assinale a alternativa correta.

- (A) A hipertensão gestacional é o estado hipertensivo registrado antes do início da gestação no período que precede a 20ª semana de gravidez ou além de doze semanas após o parto.
- (B) A hipertensão crônica refere-se ao aumento da pressão arterial que ocorre após a 20ª semana de gestação,

mais frequentemente perto do parto ou no puerpério imediato, sem proteinúria.

- (C) A pré-eclâmpsia é caracterizada pelo aparecimento de hipertensão e proteinúria (300mg ou mais de proteína em urina de 24h).
- (D) O ácido fólico eleva-se precocemente na pré-eclâmpsia e tem correlação positiva com lesões de ateromatose do leito placentário.

25. É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Assim, assinale a alternativa correta, que descreve o aleitamento materno predominante.

- (A) Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.
- (B) Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
- (C) Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo e não de substituí-lo.
- (D) Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.

26. Para as mães manterem a lactação após retornarem ao trabalho, é importante que o enfermeiro estimule os familiares a algumas medidas que facilitam a manutenção do aleitamento materno. Quanto ao armazenamento do leite ordenhado e/ou forma adequada de ofertá-lo à criança, assinale o item correto.

- (A) Devem-se orientar as mães sobre o fato de que o leite cru (não pasteurizado) pode ser conservado em geladeira por 24 horas e, no *freezer* ou congelador, por 30 dias. O leite deve ser descongelado, aquecido no forno ou micro-ondas e ofertado à criança em copo ou xícara.
- (B) Devem-se orientar as mães sobre o fato de que o leite cru (não pasteurizado) pode ser conservado em geladeira por 24 horas e, no *freezer* ou congelador, por 30 dias. O leite deve ser descongelado, aquecido em banho-maria e ofertado à criança em copo, xícara ou mamadeira, conforme a aceitação da criança.
- (C) Devem-se orientar as mães sobre o fato de que o leite cru (não pasteurizado) pode ser conservado em geladeira por 12 horas e, no *freezer* ou congelador, por 15 dias. Durante a ordenha, não podem ser ordenhados os dois seios simultaneamente em um único vasilhame.
- (D) Devem-se orientar as mães sobre o fato de que o leite cru (não pasteurizado) pode ser conservado em geladeira por 12 horas e, no *freezer* ou congelador, por 15 dias. Para alimentar o bebê, o leite deve ser descongelado em banho-maria, fora do fogo.

27. No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), o enfermeiro tem atuado na implementação de políticas em vários setores, por isso conhecer as bases legais e políticas do SUS é condição primordial para a profissão. Assim, o enfermeiro precisa saber que a Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS 2001 tem como foco principal:

- (A) estabelecer o processo de descentralização e regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- (B) incentivar a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- (C) promover a ação comunitária, por meio do respeito às diversas identidades culturais nos canais efetivos de participação nos processos decisórios dos cidadãos.
- (D) detectar e prevenir qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.

28. O Sistema Único de Saúde e seus princípios básicos e de organização são pautados em diversos documentos que regem suas bases legais nos níveis federal, estadual e municipal. Assinale a alternativa correta no que se refere à competência da direção estadual do SUS.

- (A) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de alimentação e nutrição e saúde do trabalhador.
- (B) Definir e coordenar os sistemas das redes integradas de assistência de alta complexidade.
- (C) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
- (D) Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.

29. Esta definição “Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização dos serviços de saúde” se refere à caracterização:

- (A) da região de saúde.
- (B) do mapa da saúde.
- (C) da rede de atenção a saúde.
- (D) da vigilância em saúde.

30. Acerca das bases legais, princípios básicos e de organização do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as alternativas seguintes.

- I. O princípio da integralidade se refere à forma de organização dos estabelecimentos de saúde com a população usuária.
- II. A equidade em saúde, princípio do SUS, diz respeito à necessidade de se “tratar igualmente os desiguais”.
- III. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, instituiu as bases da universalização do direito à saúde.
- IV. O campo de atuação do SUS envolve, além de outras áreas, a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

Assinale o item que está correto.

- (A) As alternativas II e III estão corretas.
- (B) As alternativas III e IV estão corretas.
- (C) As alternativas I e II estão corretas.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.