

- 01.** Assinale o Princípio da Bioética que está relacionado a fazer o bem, o que significa que o profissional de saúde tem a obrigação moral de agir para o benefício do outro.
- (A) Princípio da não maleficência.
(B) Princípio da justiça.
(C) Princípio da beneficência.
(D) Princípio da humanidade.
- 02.** A Resolução COFEN Nº 564/2017 trata sobre o quê?
- (A) Aprovação do novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
(B) Estabelecimento de normas e padrões para a fabricação, expedição, utilização e controle das carteiras de identidade profissional, certificado de registro de empresas e certificado digital do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem.
(C) Atualização da Norma Técnica que dispõe sobre a atuação de Enfermeiro e de Técnico de Enfermagem em hemoterapia.
(D) Instituição da concessão de Anotação de Responsabilidade Técnica nos Serviços de Enfermagem prestados de forma autônoma e/ou liberal.
- 03.** A advertência verbal, conforme o Código de Ética vigente, consiste na:
- (A) proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 (noventa) dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
(B) perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 (trinta) anos e será divulgada nas publicações do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
(C) repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
(D) admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- 04.** Conforme o Decreto Nº 94.406/87, assinale o item correto.
- (A) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau superior, e participação no planejamento da assistência de enfermagem.
(B) Incumbe a todo o pessoal de enfermagem cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem.
(C) O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sem supervisão.
(D) É privativo do Técnico de Enfermagem a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- 05.** Acerca da COVID-19, assinale o item correto.
- (A) A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-1.
(B) São sintomas menos comuns e que podem afetar alguns pacientes: a conjuntivite, a dor de garganta e dores nos músculos ou juntas.
(C) Existem apenas quatro variantes da COVID-19 e são: Alfa, Beta, Gama e Delta.
(D) Ambientes fechados e no ar-condicionado são indicados para evitar a disseminação do vírus.
- 06.** No que se refere à Política Nacional de Humanização (PNH), lançada em 2003, assinale a alternativa correta.
- (A) Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado.
(B) Os trabalhadores devem ser agentes passivos das mudanças no serviço de saúde.
(C) Incluir usuários e suas redes sociofamiliares nos processos de cuidado é um recurso desestimulado, pois diminui a corresponsabilização no cuidado de si.
(D) Essa política aponta a cogestão como a criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho.
- 07.** Analise o trecho abaixo e assinale o item que preenche corretamente a lacuna da afirmação.
- A _____ implica no dever de se abster de fazer qualquer mal para os clientes, de não causar danos ou colocá-los em risco.
- (A) beneficência.
(B) não maleficência.
(C) autonomia.
(D) justiça.
- 08.** O Programa Nacional de Segurança do Paciente propõe:
- (A) um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde – eventos ou circunstâncias que poderiam resultar ou que resultaram em dano desnecessário para o paciente.
(B) aprimorar a participação social na pactuação das metas de cobertura vacinal e no acompanhamento dos resultados das ações de vacinação.
(C) atender a uma demanda emergencial de ausência ou escassez de profissionais da saúde em regiões prioritárias para o SUS.
(D) levar às vítimas em situações de urgência ou emergência atenção médica necessária da maneira mais rápida possível, evitando sofrimento, sequelas, ou até mesmo a morte.
- 09.** As Normas Regulamentadoras (NR) são um compilado de obrigações, direitos e deveres de trabalhadores e empregadores para garantir a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. Marque o item que contém a NR que aborda a segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde.
- (A) NR-5.
(B) NR-17.
(C) NR- 21.
(D) NR-32.

10. O Ministério da Saúde aderiu à campanha “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” com o objetivo de contribuir com as equipes cirúrgicas na redução de erros e danos ao paciente, a partir da implantação da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (LVCS). Conforme essa lista, a avaliação de alergias deve ser realizada:

- (A) na administração da antibioticoterapia.
- (B) antes da indução anestésica.
- (C) na incisão cirúrgica.
- (D) antes de o paciente sair da sala de operações.

11. Em relação ao controle de infecção hospitalar, analise os itens.

- I. A forma mais simples e efetiva de evitar a transmissão de infecções em ambiente hospitalar é a higienização de mãos.
- II. A higienização das mãos pode ser feita exclusivamente com água e sabão.
- III. As cirurgias contaminadas são aquelas realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras, na ausência de supuração local.
- IV. As cirurgias infectadas são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso (supuração local) e/ou tecido necrótico.

Dos itens acima:

- (A) os itens I, III e IV estão corretos.
- (B) os itens I, II e III estão corretos.
- (C) os itens I e IV estão corretos.
- (D) todos os itens estão corretos.

12. Sobre a administração de medicamentos, assinale o item que preenche corretamente a lacuna da afirmativa. “Na via _____, a absorção da medicação é lenta. É uma via muito utilizada para administração de medicamentos contra trombose (heparina) e para diabetes (insulina).”

- (A) intravenosa.
- (B) intramuscular.
- (C) subcutânea.
- (D) retal.

13. Assinale a alternativa que apresenta uma das terapias farmacológicas de primeira escolha para controle glicêmico na mulher com diabetes mellitus gestacional (DMG).

- (A) Metildopa.
- (B) Losartana Potássica.
- (C) Insulina.
- (D) Dipirona.

14. Avalie as seguintes assertivas sobre a classificação de incidentes com pacientes.

- I) Near Miss: se refere a um incidente que atingiu o paciente.
- II) Incidente sem dano: atinge o paciente, mas não causa dano.

Marque a alternativa correta acerca das sentenças avaliadas.

- (A) As duas afirmativas são verdadeiras.
- (B) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
- (C) A afirmativa II é verdadeira e a I é falsa.
- (D) As duas afirmativas são falsas.

15. Acerca do sulfato de magnésio sabe-se que é a medicação mais importante para prevenção e tratamento da eclampsia. Analise as assertivas a seguir e marque o item correto.

- (A) Pode ser administrado por via intravenosa ou intramuscular.
- (B) Devemos manter observação cuidadosa da paciente durante o uso.
- (C) Pacientes que tiveram episódios de eclampsia devem passar por estabilização clínica e avaliação da vitalidade fetal.
- (D) O gluconato de magnésio a 10 % é o antídoto dessa medicação.

16. Sobre o alívio da dor no parto, leia:

- I. O óxido nitroso a 50% em veículo específico pode ser oferecido para alívio da dor no trabalho de parto, quando possível e disponível, mas informar às mulheres que elas podem apresentar náusea, tonteados, vômitos e alteração da memória.
- II. Os opioides não devem ser utilizados de rotina, pois estes oferecem alívio limitado da dor e apresentam efeitos colaterais significativos para a mulher (náusea, sonolência e tonteados) e para a criança (depressão respiratória ao nascer e sonolência que pode durar vários dias), assim como interferência negativa no aleitamento materno.

Após a análise dos itens acima, marque a alternativa correta.

- (A) As duas afirmativas são verdadeiras.
- (B) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
- (C) A afirmativa II é verdadeira e a I é falsa.
- (D) As duas afirmativas são falsas.

17. Sobre o parto humanizado, marque o item que apresenta apenas tecnologias apropriadas para a assistência ao nascimento e parto.

- (A) Acolhimento e episiotomia.
- (B) A bola de Bobath e as massagens relaxantes.
- (C) A ambientação e o uso de fórceps.
- (D) Estímulo à deambulação e aos toques vaginais.

18. Sobre o cuidado de enfermagem ao recém-nascido em alojamento conjunto. Assinale a afirmativa correta.

- (A) O alojamento conjunto é o local em que a mulher e o recém-nascido doente, logo após o nascimento, permanecem juntos, em tempo integral, até a alta.
- (B) O alojamento conjunto aumenta o risco de infecção relacionada à assistência em serviços de saúde.
- (C) O alojamento conjunto dificulta a interação de outros membros da família com o recém-nascido.
- (D) O alojamento conjunto favorece o estabelecimento efetivo do aleitamento materno.

19. Julgue os itens que tratam sobre Alojamento Conjunto.

I - Avaliar as puérperas a cada 48 horas, com atenção aos sinais de alerta para complicações no período pós-parto, tais como sangramento vaginal aumentado, febre, dor exacerbada, edema assimétrico de extremidades, sinais inflamatórios de ferida cirúrgica, sinais de sofrimento psíquico e depressão pós-parto.

II - Promover e proteger o aleitamento materno sob livre demanda, apoiando a puérpera na superação de possíveis dificuldades de acordo com suas necessidades específicas e respeitando suas características individuais.

III - Garantir à mulher o direito à acompanhante, de sua livre escolha, durante toda a internação, e a receber visitas diárias, inclusive de filhos menores.

IV - Orientar e estimular o contato pele a pele, posição canguru, pelo tempo que a mãe e o pai considerarem oportuno e prazeroso, especialmente quando se tratar de recém-nascido com peso inferior a 1500g.

Estão corretos:

- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.

20. Evandro, técnico de enfermagem, não administrou a medicação da sua paciente durante o plantão. Qual falha de processo ético o profissional cometeu?

- (A) Peculato.
- (B) Imperícia.
- (C) Imprudência.
- (D) Negligência.

21. A atividade sexual durante o terceiro trimestre da gravidez não está relacionada ao aumento de prematuridade e à mortalidade perinatal. Entretanto, é importante considerar a possibilidade de contrair alguma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que prejudique a gestação ou que possa ser transmitida verticalmente. Assinale a patologia que é transmitida verticalmente.

- (A) Candidíase.
- (B) Vaginose bacteriana.
- (C) Gonorreia.
- (D) Lúpus.

22. Sobre os fluxos de atendimento após classificação de risco em gestantes, uma paciente com a classificação laranja deve ter o atendimento em que período de tempo?

- (A) Em até 15 minutos.
- (B) Em até 25 minutos.
- (C) Em até 35 minutos.
- (D) Em até 45 minutos.

23. O pós-parto é um momento muito delicado para a mulher, pois envolve o cuidado do bebê e as mudanças físicas e emocionais, no cotidiano e nas relações sociais. Acerca do puerpério, assinale o item correto.

- (A) O estado depressivo mais brando que acontece no puerpério, conhecido como *baby blues* ou *blues puerperal*, ocorre em 10% a 30% das mulheres e é transitório.
- (B) Puérperas que tiveram o pré-natal em serviço de alto risco devem retornar também ao serviço especializado.
- (C) No puerpério imediato, exercícios de reeducação postural e ganho de força dos músculos abdominais devem ser encorajados.
- (D) Em casos de mastite, o aleitamento materno deve ser desencorajado.

24. Assinale a opção que completa a lacuna em branco da frase a seguir.

A _____ é associada ao alto peso ao nascer, decorrente da falta de controle glicêmico adequado em recém-nascidos.

- (A) Hipotermia.
- (B) Icterícia.
- (C) Hipoglicemia.
- (D) Hipertermia.

25. Sabe-se que a melhor assistência ao parto diminuiu muito a ocorrência de lesões por traumatismos obstétricos, mas elas ainda são encontradas, principalmente associadas aos partos distócicos. Assinale a alternativa correta.

- (A) As fraturas decorrentes de traumatismos obstétricos mais comuns são as de fêmur e quadril.
- (B) A paralisia obstétrica ocorre no membro inferior, causada por lesão do plexo braquial, e caracteriza-se pela flacidez e incapacidade de movimentação do membro.
- (C) O descolamento epifisário traumático pode ocorrer com mais frequência no fêmur e quadril. Um trauma de origem obstétrica, por exemplo, ao puxar o membro para liberar a criança, pode causar fratura entre o osso e sua extremidade cartilaginosa.
- (D) O tratamento de fratura de clavícula é feito apenas com tipoia e não se recomenda realizar enfaixamento de todo o membro superior no tórax, pois causa desconforto, dermatite e pode interferir na respiração.

26. Assinale o item CORRETO.

- (A) Mulheres em trabalho de parto não podem ingerir líquidos.
- (B) Uma mulher em trabalho de parto deve ser deixada sozinha, exceto por curtos períodos ou por sua solicitação.
- (C) Sempre que possível deve ser oferecido à mulher a imersão em água para alívio da dor no trabalho de parto.
- (D) A hipnose não pode ser oferecida às mulheres durante o trabalho de parto.

27. O uso de corticosteroides em gestantes de risco para parto prematuro tem o objetivo de:

- (A) auxiliar o amadurecimento do pulmão fetal em gestações prematuras.
- (B) reduzir a incidência de hipertensão grave.
- (C) aumentar os níveis de pressão sistólica, em gestantes com hipotensão postural.
- (D) aumentar progressivamente o volume de líquido amniótico.

28. Sobre a eliminação de mecônio imediatamente antes ou durante o trabalho de parto, analise as sentenças a seguir e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

I. (___) É indicado o uso de sistemas de gradação e classificação de mecônio para a conduta na eliminação de mecônio imediatamente antes ou durante o trabalho de parto, exceto quando se considerar a amniotomia ou como critério de transferência.

II. (___) Tanto a monitorização eletrônica contínua da frequência cardíaca fetal, se disponível, como a ausculta fetal intermitente, seguindo técnicas padronizadas, podem ser utilizadas para avaliação do bem-estar fetal diante da eliminação de mecônio durante o trabalho de parto.

Conforme explicitado acima, marque a alternativa corresponde à sequência correta.

- (A) V, V.
- (B) V, F.
- (C) F, V.
- (D) F, F.

29. Gestante, 28 semanas, chegou à emergência da maternidade com PA \geq 140/90 mmHg e os seguintes sintomas: dor de cabeça, dor de estômago e alterações visuais. Após a classificação de risco gestacional, assinale o item que contém a cor da pulseira colocada na paciente.

- (A) Amarela.
- (B) Laranja.
- (C) Azul.
- (D) Vermelha.

30. A rotura uterina é uma complicação muito grave em obstetrícia, sendo uma importante causa de morbimortalidade materna. É uma urgência obstétrica que leva a risco de vida tanto da mãe quanto do feto. Acerca da rotura uterina, assinale o item correto.

- (A) O maior fator de risco para rotura é a presença de cicatriz uterina e o antecedente de cesariana é o principal delas.
- (B) O uso de ocitocina para condução do trabalho de parto aumenta o risco de rotura.
- (C) A rotura uterina causa hipertensão grave.
- (D) O parto vaginal é associado à rotura uterina.