

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Mulher, gestante, 40 anos, procurou o posto de saúde por apresentar quadro de febre moderada, mialgia, exantema, artralgia de extremidades, prurido leve e cefaleia com início dos sintomas há sete dias. Nega outras queixas. Ao ser questionada, afirma presença de mosquito *Aedes ssp* em sua residência. As questões 01 e 02, abaixo, referem-se a esse caso.

01. É **CORRETO** afirmar.

- (A) A paciente apresenta típico caso de Dengue, desconsiderando Zika ou Chikungunya.
- (B) O tratamento inicial para esse caso é hidratação + salicilatos + prednisona oral.
- (C) Nenhum exame físico ou laboratorial é necessário para o caso, bastando a história clínica.
- (D) A Chikungunya, geralmente, apresenta febre, artralgia e linfopenia mais intensas do que a Dengue.

02. Ainda sobre o caso, é **CORRETO** afirmar.

- (A) A Chikungunya apresenta uma fase crônica que pode perdurar por três meses ou mais, além de poder ocorrer alopecia, bursite, dor neuropática e depressão.
- (B) Gestantes infectadas por Zika terão fetos com microcefalia em todos os casos.
- (C) Gestante apenas com suspeita de Zika não é caso de notificação compulsória.
- (D) Em gestantes com confirmação de infecção por Zika e com fetos com microcefalia, é obrigatório o parto cesariano.

03. Em julho de 2018, duas estudantes da UFRJ tiveram confirmação de caso de sarampo, mesmo sem terem viajado ou tido contato com casos suspeitos. Além desses, outros 18 casos foram confirmados na cidade do Rio de Janeiro. Sobre sarampo, é **INCORRETO**.

- (A) O homem é o único reservatório do vírus do sarampo que pertence à família *Paramyxoviridae*.
- (B) Pode apresentar como sintomatologia: exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza nasal, conjuntivite e manchas de Koplik.
- (C) Mães que já tiveram a doença ou foram vacinadas não conseguem passar seus anticorpos via placentária, assim a vacinação deve ser realizada até os seis primeiros meses do nascimento das crianças.
- (D) É uma doença de notificação compulsória no Brasil e até o final dos anos 70 foi, dentre as doenças infectocontagiosas, uma das principais causas de óbito, sobretudo em crianças menores de 5 anos.

04. Ainda sobre sarampo, o Ministério da Saúde considera que quais casos devem ser notificados compulsoriamente?

- (A) Apenas casos que apresentam complicações ou morte.
- (B) Todos os casos que necessitam de hospitalização.
- (C) Todos os casos identificados.
- (D) Todos os casos diagnosticados com confirmação laboratorial.

05. Catador de lixo vem à Unidade Básica de Saúde da Família (UBASF) no final da quadra chuvosa no Ceará, com quadro de mialgia e insuficiência renal aguda associada à hipocalemia. Sua etiologia mais provável é:

- (A) Glomerulonefrite rapidamente progressiva.
- (B) Leptospirose.
- (C) Rabdomiólise.
- (D) Tétano acidental.

06. A cantora Simaria, da dupla com Simone, foi afastada dos palcos devido a diagnóstico e tratamento de tuberculose (TB) ganglionar. Sobre essa doença, é **CORRETO** afirmar.

- (A) A tuberculose ganglionar é uma das formas de TB extrapulmonar e é mais prevalente que a TB pulmonar no Brasil.
- (B) A TB ganglionar é mais prevalente em mulheres de meia-idade do que em lactentes e crianças pequenas.
- (C) A TB ganglionar decorre da progressão via linfática e não via hematogênica, e as cadeias ganglionares mais acometidas são as cadeias inguinais, axilares e mamárias.
- (D) O teste tuberculínico é geralmente útil dentro do contexto clínico, radiológico e epidemiológico. Entretanto, em pacientes com AIDS, não há reação ao teste tuberculínico. O diagnóstico definitivo baseia-se no isolamento do agente etiológico.

07. Segundo o site G1, o Brasil teve 26.000 casos de poliomielite de 1968 a 1989 e não registra casos há 30 anos. No entanto, é possível ocorrer uma nova epidemia de poliomielite no Brasil com a significativa imigração de venezuelanos no último ano, dados os registros dessa doença na Venezuela. Sobre poliomielite, é **INCORRETO**.

- (A) A transmissão ocorre principalmente por contato direto, pessoa a pessoa, pela via fecal-oral e oral-oral; além de água e objetos contaminados por fezes de doentes ou portadores do vírus.
- (B) A infecção pelo poliovírus selvagem apresenta quatro formas clínicas, que são: assintomática, abortiva, meningite asséptica e forma paralisante.
- (C) A paralisia da poliomielite é flácida, simétrica e com parestesia associada; corresponde a 30% dos casos de todas as infecções.
- (D) A síndrome pós-pólio é de início insidioso, de evolução lenta, e os períodos de platô podem durar de um a dez anos.

08. Paciente procurou um clínico para fazer um check-up. Dias depois retornou ao médico com sorologia positiva apenas para Anti-HBc igG e Anti-HBs. Qual o significado desses anticorpos reagentes?

- (A) Hepatite B em fase aguda.
- (B) Imunidade adquirida por infecção.
- (C) Hepatite B crônica.
- (D) Imunidade adquirida por vacinação.

09. Um determinado exame tem 70% de sensibilidade para detecção dos metabólicos na urina de certa droga ilícita X. Caso 50 pacientes, usuários regulares da droga X, fizerem esse exame de urina, quantos poderão ser detectados pelo exame como falso-negativos?

- (A) 15.
- (B) 30.
- (C) 35.
- (D) Nenhum.

10. Zoonose é uma infecção transmissível ao homem, cujo agente etiológico tem um ou mais animais como reservatório. E o que significa anfixenose?

- (A) Infecção transmitida aos animais, a partir de um reservatório humano.
- (B) Infecção cuja transmissão se restringe aos seres humanos.
- (C) Infecção cuja transmissão se processa de maneira intercambiável entre homem e animais.
- (D) Infecção transmitida ao homem a partir de reservatório animal.

11. Segundo o DATASUS em seu Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), as principais causas de morte no Brasil atualmente são devido a:

- (A) doenças do aparelho circulatório.
- (B) doenças infectoparasitárias.
- (C) doenças ocupacionais.
- (D) neoplasias.

12. O Ceará apresenta anualmente altas taxas de gastroenterites, principalmente durante o período chuvoso. Qual a medida mais eficaz para reduzir essa condição?

- (A) Parto normal e amamentação exclusiva até os seis primeiros meses.
- (B) Expansão da rede de saneamento básico.
- (C) Alimentos orgânicos e sempre cozidos.
- (D) Vacinação para rotavírus (duas doses) e educação em saúde das famílias.

13. Homem de meia-idade procura a emergência com história de cefaleia diária de início há três semanas, com mais de uma crise por dia e duração maior que 60 minutos, e que, por vezes, a dor de cabeça o acorda. Relata também vermelhidão e lacrimejamento em olho direito, além de congestão nasal e dor excruciante restrita ao lado direito da cabeça, que lhe causa bastante inquietação. O diagnóstico, segundo a sintomatologia apresentada pelo paciente, é:

- (A) enxaqueca.
- (B) cefaleia tensional.
- (C) arterite temporal.
- (D) cefaleia em salvas.

14. Nefropatia diabética ou doença de Kimmelstiel-Wilson é a principal causa de morte em pacientes diabéticos e pode ser funcionalmente silenciosa por mais de 10 anos. Qual exame é o mais sensível e com alta especificidade para detecção precoce da nefropatia diabética?

- (A) Microalbuminúria.
- (B) Clearance de creatinina.
- (C) Nível de ureia plasmática.
- (D) Sumário de urina.

15. Paciente relata que sofre de doença pulmonar e traz consigo uma espirometria que revela um aumento do volume residual pulmonar. Que doença ele apresenta?

- (A) Silicose.
- (B) Pneumonia em organização criptogênica.
- (C) Enfisema.
- (D) Fibrose pulmonar idiopática.

16. Paciente masculino, 80 anos, diagnosticado com fibrilação atrial crônica e abandono de terapia com anticoagulante há bastante tempo. Vai ao consultório médico com dor abdominal pós-prandial de início em região periumbilical que evoluiu para

dor abdominal difusa. Ao exame físico, evidencia-se irritação peritonial. A hipótese diagnóstica para esse caso é:

- (A) pancreatite aguda.
- (B) diverticulite de colo.
- (C) úlcera duodenal perfurada.
- (D) infarto enteromesentérico.

17. Segundo o Ministério da Saúde (MS), o suicídio é um grave problema de saúde pública que envolve questões socioculturais, históricas, psicossociais e ambientais. Tanto os fatores de risco, quanto os de proteção, para o comportamento suicida e para o suicídio são complexos, com múltiplas determinações, podendo ser prevenidos através de intervenções oportunas embasadas em dados confiáveis. Sobre suicídio, marque **V**, para verdadeiro, e **F**, para falso.

() A autoagressão está entre as três primeiras causas de morte entre as pessoas com idade entre 15 e 55 anos em todo o mundo.

() A população indígena brasileira apresenta mais altas taxas de suicídio, fenômeno análogo ao de outros países com população indígena.

() No Brasil, as mulheres são as mais afetadas pelo suicídio, especialmente aquelas com 70 anos de idade ou mais. O suicídio feminino é de 2 a 4 vezes mais frequente, dependendo da faixa etária.

() No Brasil, ocorrem cerca de 10.000 mortes por suicídio por ano, com valores estáveis ao longo dos últimos anos.

() É objetivo do Ministério da Saúde, reconhecer as especificidades do suicídio entre os povos indígenas no planejamento e implementação de ações estratégicas relacionadas à temática.

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- (A) V-V-V-F-F.
- (B) V-F-F-V-F.
- (C) V-V-F-V-V.
- (D) V-F-V-F-V.

18. O dia nacional de combate ao fumo de 2018 trouxe a feliz constatação de que o Brasil reduziu em mais de 42% o número de fumantes passivos em oito anos. Sobre o tabagismo, marque **V**, para verdadeiro, e **F**, para falso.

() A fumaça expelida pelo cigarro contém, em média, três vezes mais nicotina e monóxido de carbono, e até cinquenta vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça inalada pelo fumante após passar pelo filtro do cigarro.

() Os efeitos de longo prazo do fumo passivo são: risco aumentado em aproximadamente 30% de câncer de pulmão e 24% de infarto do miocárdio, aumento do risco de câncer de seios da face, além de desenvolvimento ou agravamento de bronquite crônica.

() Constipação intestinal, inquietação, alterações do sono e dor de cabeça são alguns dos principais sintomas da abstinência à nicotina.

() Pacientes com comorbidades psiquiátricas e tabagistas não são incentivados ao abandono do tabaco, pois a cessação do tabagismo associa-se ao aumento de sintomas de depressão, ansiedade e estresse.

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- (A) V-V-V-F.
- (B) F-V-V-V.
- (C) V-V-F-F.
- (D) F-V-F-V.

19. Paciente de 27 anos vai ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) apresentando comportamento socialmente inadequado, desinibido e impulsivo. Tal padrão comportamental surgiu após acidente com motocicleta, em que o paciente estava de capacete, e mesmo assim teve traumatismo e lesão cerebral. Qual lobo está comprometido?

- (A) Temporal.
- (B) Frontal.
- (C) Occipital.
- (D) Parietal.

20. Mãe leva filha de 16 anos à consulta psiquiátrica com história de hipersonia de até 22 horas/dia. Relata que, quando a filha levanta da cama, apresenta apetite voraz, acompanhado de irritabilidade, desorientação, apatia e, por vezes, alucinações. A mãe tem notado a filha mais libidínica e com sexualidade “aflorada”. Tem história familiar de esquizofrenia. Já fez exames de imagem e vários exames laboratoriais, todos sem alterações. Iniciou tratamento com aripiprazol e olanzapina, sem resultados. Diante do caso exposto, que doença a jovem apresenta?

- (A) Síndrome de Gilles de la Tourette.
- (B) Narcolepsia.
- (C) Síndrome de Kleine-Levin.
- (D) Sonilóquio.

21. Paciente masculino, 21 anos, vai à consulta no CAPS com história de isolamento social, faz tudo praticamente sozinho, nunca namorou, não tem amigos íntimos, não sai de casa para atividades ou lazer. Na consulta demonstrou frieza emocional e distanciamento. De acordo com a história acima, que transtorno de personalidade esse paciente porta?

- (A) Esquizoide.
- (B) Antissocial.
- (C) Esquizotípica.
- (D) Esquiva.

22. Você foi chamado para atendimento domiciliar de um paciente idoso com demência. Ao chegar à residência do paciente, você foi informado que o paciente tem Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN). Além da demência, que outros sintomas ele pode apresentar?

- (A) Cefaleia e náuseas.
- (B) Convulsões e sonolência excessiva.
- (C) Nistagmo e confusão mental.
- (D) Distúrbio da marcha e incontinência urinária.

23. O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é tratado com antidepressivos com maior eficácia, atuando predominantemente em qual sistema de neurotransmissores?

- (A) Gabaérgicos.
- (B) Serotoninérgicos.
- (C) Noradrenérgicos.
- (D) Dopaminérgicos.

24. Depressão é uma doença de prevalência significativa e vem aumentando progressivamente nos últimos anos. Sobre depressão, marque **V**, para verdadeiro, e **F**, para falso.

() A prevalência é de aproximadamente 5 a 9% na população geral e de 8 a 20% em pacientes ambulatoriais na atenção primária.

() Melancólica, catatônica, mista, sazonal e atípica são alguns tipos de transtorno depressivo maior.

() Doenças como hipotireoidismo, anemias importantes, infecções do sistema nervoso e síndromes paraneoplásicas fazem diagnóstico diferencial com a depressão.

() No geral, há baixas taxas de subdiagnósticos e de tratamentos inadequados.

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- (A) V-V-V-F.
- (B) F-V-V-F.
- (C) V-F-F-V.
- (D) F-F-F-V.

25. Paciente masculino, 60 anos, previamente hígido, iniciou há oito meses uma dor precordial em queimação aos esforços intensos, irradiada para o ombro esquerdo. Associadas a essa dor, taquicardia e dispneia. Tem história de parente em primeiro grau com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Fez um Eletrocardiograma (ECG) em repouso que não revelou anormalidades. Quais exames são necessários para o diagnóstico desse caso?

- (A) Hemograma completo e radiografia de tórax.
- (B) Cateterismo de urgência e ecocardiograma.
- (C) Dosagem de CK-MB e cintilografia do miocárdio.
- (D) Teste de esforço (ergométrico) e ecocardiograma.

26. Paciente masculino, 27 anos, chega ao pronto-socorro com história de síncope, além de relatar precordialgia há dois dias. Foi realizado estudo de caso e não se evidenciou doença coronariana. O diagnóstico mais provável para esse caso é:

- (A) síndrome de Brugada.
- (B) estenose da valva aórtica.
- (C) estenose da valva mitral.
- (D) insuficiência da valva mitral.

27. Qual dos distúrbios abaixo é mais frequentemente associado à síndrome de Guillain-Barré?

- (A) Doença da junção mioneural.
- (B) Distonia de torção.
- (C) Paralisia flácida aguda.
- (D) Ataxia cerebelar.

28. Pessoas sofrem intoxicações por produtos diversos diariamente. Ao chegar ao hospital, inicialmente, são feitos o suporte e as medidas de primeiros socorros concomitantemente à realização de perguntas sobre qual possível produto causou intoxicação para a correta medida terapêutica. Posto isso, correlacione a primeira coluna, relativa ao antídoto/antagonista para tratar a respectiva intoxicação, na segunda coluna.

- | | |
|--------------------|---|
| (1) Acetilcisteína | () Hipoglicemiantes orais (sulfonilureias) |
| (2) Diazepam | () Heparina |
| (3) Flumazenil | () Agentes anticolinérgicos |
| (4) Fentolamina | () Opioides |
| (5) Fisostigmina | () Precordialgia por cocaína e anfetaminas |
| (6) Naloxona | () Paracetamol |
| (7) Octreotida | () Benzodiazepínicos |
| (8) Protamina | () Medicamentos simpaticomiméticos (inibidores da Mao e Clonidina) |

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- (A) 8-7-4-5-2-1-3-6.
- (B) 4-8-6-5-2-3-1-7.
- (C) 7-5-4-6-8-1-2-3.
- (D) 7-8-5-6-2-1-3-4.

29. Paciente chegou ao pronto atendimento com história de vômitos sucessivos, após ingestão de alimento duvidoso quanto à conservação. Imediatamente o médico plantonista prescreveu hidratação e metoclopramida. A técnica de enfermagem fez a medicação em infusão rápida e, em seguida, fez a hidratação venosa. Pouco tempo depois o paciente teve uma sensação subjetiva de desassossego interior com forte desejo de movimentar o corpo, gerando assim disforia e ansiedade forte. Qual efeito a medicação causou?

- (A) Discinesia tardia.
- (B) Acatisia.
- (C) Distonia.
- (D) Síndrome serotoninérgica.

30. Sobre medicação utilizada amplamente em psiquiatria, marque **V**, para verdadeiro, e **F**, para falso.

() Antidepressivos atuam, principalmente, nos sistemas receptores gabaérgicos e glutamatérgicos.

() Pacientes que usam citalopram (inibidor seletivo da recaptção da serotonina) têm de monitorizar os níveis de magnésio e potássio e fazer ECG, pois essa medicação pode aumentar o intervalo QT.

() Pacientes depressivos portadores de dor crônica têm como boa escolha duloxetine, venlafaxina e nortriptilina.

() Antidepressivos possuem múltiplas indicações, incluindo várias formas de depressão, transtornos de ansiedade, bulimia e TOC.

() O carbonato de lítio é utilizado para tratar transtorno bipolar e seu uso é bastante seguro, pois seus metabólitos são excretados totalmente pelos rins, assim não precisando monitorar sua quantidade no corpo.

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- (A) F-V-V-V-F.
- (B) V-F-V-V-F.
- (C) F-V-V-F-F.
- (D) V-F-F-V-V.

31. Amitriptilina é amplamente utilizada no Brasil por sua multição. Devido à sua ação anticolinérgica, esse antidepressivo tricíclico deve ser evitado em quais doenças?

- (A) Dor neuropática e Acidente Vascular Cerebral (AVC).
- (B) Glaucoma de ângulo estreito e dor crônica.
- (C) Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) e demência.
- (D) Insuficiência hepática e tabagismo.

32. Em um paciente idoso com demência e início de depressão, qual antidepressivo seria a primeira escolha para tratá-lo?

- (A) Amitriptilina.
- (B) Risperidona.
- (C) Desipramina.
- (D) Citalopram.

33. Mulher, 46 anos, taxista, com endometriose sem outras comorbidades, não tabagista, etilista social, nega trauma ou cirurgias. Iniciou há um mês Anticoncepcional Combinado Oral (ACO). Relata que há três dias iniciou com dor na panturrilha direita, foi ao clínico, que suspeitou de distensão muscular e prescreveu analgésicos e Anti-inflamatório Não Esteroidal (AINE). Após cinco dias, o quadro evoluiu com piora. A partir daí, qual a melhor conduta?

- (A) Acrescentar corticosteroide injetável + miorelaxante + alongamentos.
- (B) Orientar repouso total e solicitar ultrassonografia (USG) doppler venosa de membros inferiores (MMII) de imediato.
- (C) Prescrever anti-inflamatório tópico e solicitar fisioterapia (com massagem local e alongamentos).
- (D) Prescrever ansiolítico pelo estresse do trabalho + repouso.

34. Jovem, masculino, 20 anos, deu entrada na emergência com leve rebaixamento do nível de consciência, hipotensão arterial, taquicardia, hiperpneia (respiração de Kussmaul), desidratação, com náuseas e vômitos, além de forte dor abdominal. Mãe relatou que, apesar de o filho comer bastante, apresentou franca perda de peso nos últimos meses. Enfermeira assistente notou hálito cetônico no paciente. A partir do caso apresentado, é verdadeiro afirmar.

- (A) Faz-se de imediato soro fisiológico + insulina + anti-hemético e, após estabilização do quadro em enfermaria, solicita-se exames laboratoriais específicos.
- (B) Esse é um típico quadro de libação alcoólica, sendo tratado com hidratação + glicose endovenosa (EV) + anti-hemético.
- (C) Parâmetros como glicemia > 250 mg/dL, pH arterial < 7,00, cetonúria e cetonemia positivos, ânion gap > 12 e estopor são considerados como cetoacidose diabética grave.
- (D) O paciente apresenta um típico quadro de sepse, sendo encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e iniciada investigação para descobrir o sítio infeccioso.

35. Em relação ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), marque **V**, para verdadeiro, e **F**, para falso.

() A utilização de nitratos está contraindicada em casos de infarto do ventrículo direito.

() A complicação mecânica mais frequente nos pacientes com IAM é o aneurisma de ventrículo esquerdo.

() Aspirina e betabloqueador são agentes de prevenção secundária pós-IAM.

() Sangue oculto nas fezes e menstruação são contraindicações absolutas para o uso de trombolíticos.

() A complicação clínica mais comum do IAM é extrassístole ventricular.

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- (A) F-F-V-V-F.
- (B) V-F-F-F-V.
- (C) V-V-V-F-V.
- (D) F-V-F-V-F.

36. Mulher, 36 anos, com suspeita de câncer na tireoide, fez exames laboratoriais que revelaram calcitonina sérica elevada. Qual a principal suspeita para esse caso?

- (A) Carcinoma medular.
- (B) Carcinoma folicular.
- (C) Carcinoma papilífero.
- (D) Carcinoma anaplásico.

37. Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), marque **V**, para verdadeiro, e **F**, para falso.

() Doenças como acromegalia, doença renal parenquimatosa e apneia obstrutiva do sono podem ser causa secundária de hipertensão arterial.

() Hiperfonese de 2ª bulha em foco aórtico e presença de 4ª bulha são alguns dos sinais de HAS.

() Os valores de pressão arterial (PA) sistólica ≥ 160 mmHg e diastólica < 90 mmHg são considerados como hipertensão sistólica isolada, comum em alguns idosos e tratada com monoterapia.

() Anti-hipertensivos como Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) e Bloqueadores do Receptor de Angiotensina (BRA) são contraindicados para gestantes, mas ideais para doentes com hipercalemia.

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- (A) V-V-F-F.
- (B) F-F-V-V.
- (C) V-F-F-V.
- (D) F-V-V-F.

38. Paciente, 60 anos, procurou clínico e relatou leve astenia. O médico solicitou exames laboratoriais gerais, que revelaram apenas leve anemia e leucocitose 50.000 mm^3 , com 80% de linfócitos. Para esse caso, qual o possível diagnóstico?

- (A) Mieloma múltiplo.
- (B) Leucemia linfocítica crônica.
- (C) Leucemia mieloide aguda.
- (D) Síndrome mielodisplásica.

39. O uso abusivo do álcool é um problema de saúde pública em vários países, inclusive no Brasil. Sobre intoxicação pelo álcool, marque **V**, para verdadeiro, e **F**, para falso.

() Pacientes que chegam ao pronto-socorro com intoxicação aguda (libação alcoólica), faz-se de imediato hidratação, glicose e anti-hemético endovenosos, independente da glicemia do paciente no momento.

() O uso abusivo do álcool pode provocar: intoxicação aguda, síndrome de Wernicke, amnésia de Korsakoff, síndrome de abstinência e *delirium tremens*.

() Miopatia, pancreatite, monocitose, câncer de esôfago e infertilidade podem estar relacionados ao uso abusivo do álcool ou alcoolismo.

() A naltrexona, um agonista opioide, diminui a probabilidade de retorno à bebida e encurta os períodos de recaída.

() O dissulfiram, um inibidor do aldeído-desidrogenase, produz uma reação desagradável e potencialmente perigosa na presença de álcool.

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- (A) F-V-V-F-V.
- (B) V-F-F-F-V.
- (C) V-V-F-V-F.
- (D) F-V-V-V-V.

40. Em unidades de emergência, estima-se de 10 a 30% de casos de *delirium*; em UTIs, mais de 70% dos idosos internados apresentam esse distúrbio. Sobre *delirium*, marque o item **INCORRETO**.

- (A) É uma síndrome neurocomportamental de instalação aguda com comprometimento transitório da atividade cerebral, de origem secundária a distúrbios sistêmicos.

(B) Os exames minimal e a escala CAM (Confusion Assessment Method) não servem para o auxílio no diagnóstico do *delirium*.

(C) É um distúrbio de origem multifatorial, apresenta alta taxa de subdiagnóstico e é bastante prevalente em idosos.

(D) Pacientes com *delirium* que apresentam alterações comportamentais, como exemplo a agitação, devem ser manejados com antipsicóticos para organização e controle dos sintomas.

41. Paciente feminino, meia-idade, previamente hígida, sem uso de medicação, após 30 minutos de caminhada na Beira-Mar, apresentou episódio de tontura seguida de pré-síncope. A equipe do SAMU a atendeu no momento e constatou apenas uma frequência cardíaca de 180 bpm, com ritmo irregular; realizou um ECG que revelou ausência de onda P e intervalo RR irregular. A paciente alega vir perdendo peso sem dieta. A partir do caso exposto, qual item apresenta o(s) exame(s) mais adequado(s) para a avaliação desta arritmia?

- (A) Teste de esforço (ergométrico).
- (B) Dosagem de cálcio, magnésio e potássio.
- (C) Cintilografia do miocárdio.
- (D) Dosagem de TSH e T4 livre.

42. Paciente psiquiátrico dá entrada em emergência do hospital mental com hipertermia, rigidez muscular, pseudoparkinsonismo e comportamento catatônico. Ao exame físico: sialorreico, diaforese e labilidade da pressão arterial. Aos exames laboratoriais, apresentou CPK (creatinofosfoquinase) bastante elevada. Há relato de início de uso de haloperidol há dez dias. O diagnóstico provável é:

- (A) hipertermia maligna.
- (B) síndrome neuroléptica maligna.
- (C) síndrome do pânico.
- (D) sepsse fulminante.

43. Paciente, 80 anos, diabético, em uso crônico de diazepam, foi levado à emergência com quadro súbito de desorientação espacial e confusão mental, além de agitação. Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) *Delirium*.
- (B) Doença de Alzheimer.
- (C) Transtorno conversivo.
- (D) Demência vascular.

44. O auxílio-reabilitação psicossocial é parte integrante de um programa de ressocialização de pacientes internados em hospitais ou unidades psiquiátricas, denominado "De Volta Para Casa", sob coordenação do Ministério da Saúde (MS). Sobre esse auxílio, é **INCORRETO**.

- (A) O valor do auxílio é fixo, podendo ser reajustado pelo Poder Executivo de acordo com a disponibilidade orçamentária.
- (B) Caso o paciente beneficiário seja novamente internado em hospital psiquiátrico, não haverá suspensão do auxílio.
- (C) O benefício tem duração de 1 (um) ano, podendo ser renovado quando necessário aos propósitos de reintegração social do paciente.
- (D) O controle social e a fiscalização da execução do programa são realizados pelas instâncias do SUS.

45. O artigo 6º da Lei nº 10.216/2001 regulamenta que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. São considerados os seguintes tipos de internações psiquiátricas, **EXCETO**:

- (A) internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário.
- (B) internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro.
- (C) internação compulsória: aquela determinada pela justiça.
- (D) internação parcial: aquela que é determinada pela melhora do estado mental do usuário.

46. Em relação à Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) toda pessoa com deficiência tem direito restrito, dependendo da sua funcionalidade, em relação às demais pessoas, porém não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
- (B) a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, por exemplo, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público.
- (C) é competência do poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda vida.
- (D) os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias.

47. Sobre a reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) o início da reforma psiquiátrica no Brasil teve como metas: crítica do modelo hospitalocêntrico e, em seguida, o começo da implantação da rede extra-hospitalar.
- (B) no período compreendido entre 1996 e 2005, houve uma redução de aproximadamente 30.000 leitos em hospitais psiquiátricos.
- (C) um dos principais desafios da reforma psiquiátrica é a potencialização do trabalho como instrumento de inclusão social dos usuários dos serviços.
- (D) essa reforma foi restrita a doentes com doenças mentais, não incluindo a política de transtornos ao consumo de álcool e outras drogas, que está vinculada a outra portaria.

48. De acordo com o artigo 28 da Lei nº 8080, dos Recursos Humanos, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, só poderão ser exercidos em regime de:

- (A) tempo integral.
- (B) tempo parcial (30 horas/semana).
- (C) tempo parcial (20 horas/semana).
- (D) escala a ser determinada de acordo com a necessidade.

49. Sobre os direitos e a proteção das pessoas acometidas por transtorno mental, marque **V**, para verdadeiro, e **F**, para falso.

() É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

() A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado onde se localiza o estabelecimento.

() A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

() É vedada a internação de pacientes com transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, sem estrutura suficiente a oferecer assistência integral.

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- (A) V-F-F-V.
- (B) V-V-F-F.
- (C) V-V-V-V.
- (D) F-F-F-F.

50. A gestão municipal deve articular e criar condições para que a referência aos serviços especializados ambulatoriais sejam realizados preferencialmente pela Atenção Básica. Sobre as responsabilidades da gestão municipal, marque **V**, para verdadeiro, e **F**, para falso.

() Ordenar o fluxo de pessoas nos demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

() Divulgar periodicamente os relatórios de indicadores da Atenção Básica, com o intuito de assegurar o direito fundamental de acesso à informação.

() Gerir a referência e a contrarreferência em outros pontos de atenção.

() Estabelecer relação com os especialistas que cuidam das pessoas do território.

A sequência **CORRETA** de cima para baixo é:

- (A) V-F-F-V.
- (B) V-F-V-V.
- (C) F-V-F-F.
- (D) F-V-V-F.