

01. A Enfermagem e as suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no:

- (A) Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- (B) Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- (C) Conselho Estadual de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- (D) Conselho Municipal de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.

02. Assinale a alternativa CORRETA, conforme art. 12., da Lei nº 7.498, na qual o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente:

- (A) participar da programação da assistência de Enfermagem.
- (B) executar ações assistenciais de Enfermagem, incluindo as privativas do enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 dessa lei.
- (C) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- (D) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.

03. Conforme art. 122, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são consideradas circunstâncias atenuantes:

- (A) causar danos irreparáveis.
- (B) cometer infração dolosamente.
- (C) cometer infração por motivo fútil ou torpe.
- (D) realizar ato sob emprego real de força física.

04. Assinale a alternativa que contém duas penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem:

- (A) advertência formal e multa.
- (B) multa e suspensão do exercício profissional.
- (C) advertência formal e censura.
- (D) advertência formal e suspensão do exercício profissional.

05. O termo de consentimento ou autorização de uma cirurgia deve ser assinado por todo indivíduo que passará por procedimento de caráter preventivo, diagnóstico ou terapêutico que tenha potencial de afetar sua integridade físico-psíquica ou social. Tal conduta respeita qual princípio da Bioética?

- (A) Beneficência.
- (B) Não maleficência.
- (C) Autonomia.
- (D) Justiça e equidade.

06. Quando se dá o primeiro contato da usuária que sofreu violência com um serviço de atendimento na Atenção Básica, o profissional deve estar atento às condutas a serem tomadas. Analise as afirmativas abaixo.

- I) Recomenda-se que o profissional foque no preenchimento de fichas e de prontuários e, somente depois, realize o acolhimento.
- II) Por responsabilidade e ética profissional, as perguntas para identificação da violência devem sempre ser adotadas.

III) É importante que sejam descritos, em prontuário, os dados mais completos sobre as circunstâncias da situação de violência, colhidos em entrevista e no exame físico (com registro e classificação de todas as lesões identificadas).

IV) O profissional deve estar sensível à dificuldade de a mulher conseguir se expressar verbalmente, o que significa escutar, acolher e observar as expressões da mulher.

Das afirmativas, estão CORRETAS:

- (A) I e IV.
- (B) III e IV.
- (C) I e II.
- (D) II e III.

07. A respeito da humanização do parto, julgue as afirmativas abaixo:

- I. A permissão para a mulher ingerir alimentos leves ou fluidos durante o trabalho de parto não aumenta a incidência de complicações.
- II. O apoio físico e emocional pode ser oferecido à mulher tanto pelo seu acompanhante ou doula, assim como pelos profissionais que participam da assistência, como auxiliares e técnicos de enfermagem, psicólogos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, entre outros.
- III. A humanização produz-se como um movimento de hegemonia do modelo biomédico na assistência obstétrica engajado com a tarefa de fazer viva a aposta no SUS.

Qual (is) afirmativa (s) está (ão) CORRETA (S)?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.

08. Conforme a Política Nacional de Humanização, os espaços físicos das maternidades, nos seus projetos de reforma e de novas construções, devem estar adequados para:

- (A) estimular o aleitamento artificial ainda no ambiente do parto, criando ambiência que favoreça o conforto e a privacidade para essa situação.
- (B) estimular que o recém-nascido vá o mais rápido possível para incubadora, evitando perda de calor.
- (C) possibilitar o controle de luminosidade, de temperatura e de ruídos no ambiente conforme a decisão da equipe médica.
- (D) realizar ausculta fetal intermitente, isto é, fazer o controle dos sinais vitais da parturiente e do bebê.

09. Incidentes são eventos ou circunstâncias que poderiam resultar ou resultaram em dano desnecessário ao paciente. Há 4 grupos de incidentes. Analise o exemplo abaixo e assinale qual tipo de incidente aconteceu.

Ex.: Uma enfermeira iria colocar uma bolsa de sangue em um paciente homônimo àquele que deveria receber essa bolsa, mas percebe a falha antes de instalar.

- (A) Circunstância de risco.
- (B) Quase-erro.
- (C) Incidente sem dano.
- (D) Incidente com dano.

10. Conforme o Protocolo de Atenção Básica referente à Saúde das Mulheres, uma puérpera com ingurgitamento mamário deve fazer:

- (A) ordenha manual depois da mamada.
- (B) mamadas frequentes com horários preestabelecidos.
- (C) uso de sutiã com alças largas e firmes.
- (D) compressas quentes de, no máximo, 20 minutos entre as mamadas.

11. Assinale a alternativa correspondente ao quadro clínico do recém-nascido que pode ser assintomático ou sintomático, apresentando letargia, sucção débil, choro anormal, hipotonia, apneia, convulsão, irritabilidade, tremores, taquicardia, taquipneia, palidez, cianose e hipotermia.

- (A) Hipertermia.
- (B) Hiperglicemia.
- (C) Hipoglicemia.
- (D) Síndrome de Guillain Barré.

12. O problema da segurança cirúrgica é reconhecido por todo o mundo. Em países desenvolvidos, os estudos confirmam a magnitude e a generalização do problema. Acerca dos dez objetivos essenciais para a segurança cirúrgica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se VERDADEIRO, ou F, se FALSO.

- () A equipe evitará a indução de reação adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente de risco ao paciente.
- () A equipe comunicar-se-á efetivamente e trocará informações críticas para a condução segura da operação.
- () A equipe impedirá a retenção inadvertida de compressas ou instrumentos nas feridas cirúrgicas.
- () A equipe usará, de maneira sistemática, métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico.

A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – F – F.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – V – V.

13. Acerca dos cuidados no ciclo gravídico puerperal, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Deve-se instituir ações de profilaxia e de identificação das síndromes hipertensivas apenas na admissão do trabalho de parto.
- (B) Deve-se realizar triagem oportuna de infecções do trato geniturinário.
- (C) Deve-se manter as taxas de cesarianas desnecessárias.
- (D) Deve-se garantir a vigilância e a assistência apenas no puerpério imediato.

14. É importante lembrar-se das causas da hemorragia pós-parto por meio do mnemônico dos 4Ts:

- (A) Tônus, Trauma, Tecido, Trombina.
- (B) Trauma, Teratoma, Tireoide, Trombina.
- (C) Tônus, Trauma, Tecido, Teratoma.
- (D) Trauma, Teratoma, Taquicardia, Trombina.

15. É o primeiro medicamento utilizado na atonia uterina:

- (A) Gabapentina.
- (B) Ofloxacino
- (C) Ocitocina.
- (D) Ceftazidima.

16. O gemido expiratório do recém-nascido resulta de:

- (A) fechamento parcial da glote - manobra de Valsalva incompleta - durante a expiração para manter a CRF e para prevenir o colapso alveolar nas situações de perda de volume pulmonar.
- (B) dilatação das narinas durante a inspiração que diminui a resistência da via aérea superior.
- (C) deslocamento para dentro da caixa torácica, a cada respiração, entre as costelas (intercostal).
- (D) episódios de apneia que ocorrem nas primeiras 72 horas de vida.

17. Sobre a sífilis congênita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) É causada pelo *Trypanosoma pallidum*.
- (B) A sífilis pode ser transmitida pelo leite materno.
- (C) O tratamento de primeira escolha da sífilis congênita no período neonatal é realizado com benzilpenicilina (potássica/cristalina, procaína ou benzatina).
- (D) O VDRL é um teste treponêmico indicado para o diagnóstico.

18. É a droga preferida em gestantes com síndromes hipertensivas gestacionais por ser a mais bem estudada e por não haver evidência de efeitos deletérios para o feto:

- (A) Metiformina.
- (B) Captopril.
- (C) Furosemida.
- (D) Metildopa.

19. De acordo com o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Pacientes com rebaixamento do nível de consciência ou alteração do estado mental são classificadas como amarelo.
- (B) Pacientes com obstrução nasal com secreção amarelada são classificadas como laranja.
- (C) Pacientes com saturação de $O_2 \geq 90\%$ e $\leq 94\%$ (ar ambiente) são classificadas como laranja.
- (D) Pacientes com vômitos frequentes sem desidratação são classificadas como azul.

20. Os métodos não farmacológicos (MNF) são uma opção para substituir analgesia durante o TP/parto e para auxiliar as parturientes a lidar com suas queixas algicas. Dentre elas, incluem-se:

- (A) técnicas de respiração, óxido nitroso, massagem.
- (B) hidroterapia (banho, parto na água e banheira para imersão), opioides e massagem.
- (C) acupuntura/acupressão, estimulação elétrica transcutânea e hipnoterapia.
- (D) estimulação elétrica transcutânea, levobupivacaína e hipnoterapia.

21. Sobre o segundo período do parto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Caso o puxo espontâneo seja ineficaz ou se solicitado pela mulher, deve-se oferecer outras estratégias para auxiliar o nascimento, tais como suporte, mudança de posição, esvaziamento da bexiga e encorajamento.
- (B) A manobra de Kristeller deve ser realizada no segundo período do trabalho de parto.
- (C) Na maioria das mulheres, o parto deve ocorrer no prazo de uma hora após o início da fase ativa do segundo período.
- (D) Deve-se desencorajar a realização de puxos espontâneos no segundo período do trabalho de parto em mulheres sem analgesia, evitando os puxos dirigidos.

22. Analise as assertivas abaixo e assinale V, se VERDADEIRO, ou F, se FALSO, conforme as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal.

- Mulheres em trabalho de parto podem ingerir líquidos de preferência soluções isotônicas ao invés de somente água.
- Mulheres em trabalho de parto que não estiverem sob efeito de opioides ou não apresentarem fatores de risco iminente para anestesia geral não podem ingerir uma dieta leve.
- Os antagonistas H2 e os antiácidos devem ser utilizados de rotina para mulheres de baixo risco para anestesia geral durante o trabalho de parto.
- As mulheres que receberem opioides ou apresentarem fatores de risco que aumentem a chance de uma anestesia geral devem receber antagonistas H2 ou antiácidos.

A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – F – F.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – V – V.

23. O princípio do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares, assim, os anti-hipertensivos devem não só reduzir a pressão arterial (PA), mas também os eventos cardiovasculares fatais e não fatais, e, se possível, a taxa de mortalidade. As particularidades desses medicamentos são de vital importância para a escolha do prescritor. Acerca da hidralazina, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em gestantes com pré-eclâmpsia, deve ser administrada a dose de 20 mg/dia.
- (B) A dose de 240 ml/dia (EV ou IM) é a indicada para gestantes com sinal iminente de eclâmpsia.
- (C) É indicado o uso de uma ampola diluída em 20 ml de água destilada, administrar 5 ml da solução EV se a pressão arterial da gestante for PA > 160/110 mmHg.
- (D) Usar 10 mg, 3x/dia (VO, IM ou EV) se a pressão arterial da gestante for PA > 160/110 mmHg.

24. Dentre as repercussões das infecções sexualmente transmissíveis no recém-nascido estão situações nas quais a amamentação é contraindicada. Assinale a alternativa que corresponde a uma contraindicação da amamentação:

- (A) puérpera com sífilis.
- (B) puérpera com HTLV.
- (C) puérpera com HPV.
- (D) puérpera com HCV.

25. O alojamento conjunto é o local onde a mulher e o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanecem juntos, em tempo integral, até a alta. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao alojamento conjunto.

- (A) Recém-nascidos com acometimentos sem gravidade, como icterícia, necessitando de fototerapia, malformações menores, investigação de infecções congênitas sem acometimento clínico com ou sem microcefalia podem ficar no alojamento conjunto.
- (B) É destinado a recém-nascidos com peso maior ou igual a 1.100g e idade gestacional maior ou igual a 30 semanas.
- (C) O berço do recém-nascido deve ficar ao lado do leito da mãe e deve ser respeitada a distância mínima de três metros entre leitos ocupados.
- (D) O tempo de permanência máximo recomendado no alojamento conjunto é de 24 horas.

26. Leia as afirmativas a seguir:

I. O termo infecção hospitalar vem sendo substituído, nos últimos anos, pelo termo Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), no qual a prevenção e o controle das infecções passam a ser considerados para todos os locais onde se prestam o cuidado e a assistência à saúde.

II. A resistência a antimicrobianos (RAM) tem se tornado um problema decrescente mundialmente.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) as duas afirmativas são verdadeiras.
- (B) a afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
- (C) a afirmativa II é verdadeira e a I é falsa.
- (D) as duas afirmativas são falsas.

27. Sobre a icterícia neonatal, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O aleitamento materno exclusivo, quando ocorre de forma inadequada, é um fator associado ao desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significante na primeira semana de vida.
- (B) A icterícia constitui-se como um dos problemas menos frequentes no período neonatal e corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia.
- (C) A icterícia por hiperbilirrubinemia indireta apresenta progressão caudal-cefálica.
- (D) O aparecimento de icterícia nas primeiras 72 horas de vida alerta para a presença de doença hemolítica hereditária ou adquirida.

28. O técnico de enfermagem ao assumir o plantão da unidade obstétrica observou que no prontuário da gestante que está sob seus cuidados possui um diagnóstico de uma Infecção Sexualmente Transmissível recentemente tratada. A IST é causada por um protozoário móvel e ocasiona uma secreção vaginal amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida com o pH vaginal > 4,5. Diante das informações apresentadas, qual é a IST em questão?

- (A) Cancro mole.
- (B) Hanseníase.
- (C) Tricomoníase.
- (D) Gonorreia.

29. Na gestação, devido às modificações fisiológicas ou aos eventos adversos próprios da gravidez, sinais ou sintomas podem se sobrepor aos demais sintomas da COVID-19, dificultando o diagnóstico. A complicação mais comum da COVID-19 é a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), definida por presença de dispneia ou de outros sinais de gravidade. Assinale a alternativa que contém um sinal de gravidade.

- (A) Saturação de SpO₂ < 97% em ar ambiente.
- (B) Pulso entre 60-100 bpm.
- (C) Manutenção das condições clínicas.
- (D) Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente ou do indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória.

30. Segundo informações do *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) e do Ministério da Saúde, o período de incubação da COVID-19 varia entre:

- (A) 2 e 14 dias.
- (B) 1 e 15 dias.
- (C) 3 e 16 dias.
- (D) 4 e 15 dias.