

01. Sobre a Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986), assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A Enfermagem é exercida exclusivamente pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem respeitados os respectivos graus de habilitação.
- (B) A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas inscritas no Conselho Federal de Enfermagem.
- (C) O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem.
- (D) O técnico de enfermagem deve executar todas as ações assistenciais de Enfermagem.

02. De acordo com a revisão do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), são DEVERES dos profissionais de enfermagem, **EXCETO**:

- (A) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- (B) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e de posição ideológica.
- (C) conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- (D) anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais.

03. Acerca das infrações e das penalidades do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes: I – Advertência verbal; II – Multa; III – Suspensão do Exercício Profissional; IV – Cassação do direito ao Exercício Profissional.
- (B) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- (C) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 05 (cinco) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (D) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 60 (sessenta) dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

04. A Bioética e seus princípios surgiram para nortear a conduta humana a partir das decisões frente aos conflitos morais diante do cuidar, sendo, fundamentais para conduzir a assistência de enfermagem. Assim, conforme os princípios da bioética, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A autonomia se refere à capacidade de uma pessoa em decidir, segundo seus valores, sobre aquilo que ela julga ser o melhor para si.
- (B) A beneficência significa cuidar do paciente.
- (C) A não beneficência significa que o profissional de saúde tem o dever de não causar mal e/ou danos ao paciente.
- (D) A justiça se refere à totalidade de tratamento, oferecendo a cada pessoa o que lhe é devido, segundo suas necessidades.

05. A humanização da Assistência Obstétrica e Neonatal é condição primeira para o adequado acompanhamento da mulher durante o ciclo gravídico puerperal. Nesse contexto, para garantir uma assistência qualificada, são atribuições do técnico de enfermagem, **EXCETO**:

- (A) aferir a pressão arterial, o peso e a altura da gestante.
- (B) realizar testagem rápida para sífilis da gestante.
- (C) atualizar o cartão de vacina da gestante.
- (D) registrar o atendimento da gestante no cartão de pré-natal a cada consulta realizada.

06. Em obstetrícia, o acolhimento na porta de entrada dos hospitais e das maternidades assume peculiaridades próprias às necessidades e às demandas relacionadas ao processo gravídico. Nesse acolhimento, é responsabilidade do técnico de enfermagem:

- (A) receber as fichas de atendimento, avaliando de forma ágil e responsável a prioridade da mulher, de acordo com a queixa apresentada.
- (B) atender às mulheres que a eles competem, de forma acolhedora, de acordo com protocolo institucional e com o acesso imediato ao obstetra, quando necessário.
- (C) aferir sinais vitais da mulher.
- (D) realizar acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-nascido, sob seus cuidados, da internação até a alta.

07. A alta hospitalar a pedido do paciente sem risco iminente de vida está relacionada, principalmente, à qual princípio da Bioética?

- (A) Autonomia.
- (B) Justiça.
- (C) Beneficência.
- (D) Equidade.

08. Após o parto, puérpera é avaliada e é identificado que o fundo do útero encontra-se na cicatriz umbilical, com um bom tônus, firme, móvel e indolor. Esse achado é chamado de:

- (A) Globo de segurança de Hamilton.
- (B) Globo de segurança de Pinard.
- (C) Globo de segurança de Greenberg.
- (D) Globo de segurança de Jacob-Dublin.

- 09.** As mortes maternas podem ser classificadas como obstétricas diretas ou indiretas. As mortes diretas resultam de:
- (A) complicações surgidas durante a gravidez, o parto ou o puerpério (período de até 42 dias após o parto).
 - (B) doenças preexistentes ou que se desenvolveram durante a gestação.
 - (C) doenças que foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gestação.
 - (D) doenças autoimunes.
- 10.** O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando os aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA.
- (A) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número adequado seria igual ou superior a 5 (cinco).
 - (B) Atenção especial deverá ser dispensada às grávidas com menores riscos (grau de recomendação A).
 - (C) As consultas deverão ser mensais até a 24ª semana, quinzenais entre 24 e 36 semanas e semanais no termo (grau de recomendação D).
 - (D) Não existe alta do pré-natal.
- 11.** Em obstetrícia, o acolhimento na porta de entrada dos hospitais e das maternidades assume peculiaridades próprias às necessidades e às demandas relacionadas ao processo gravídico. Acerca do acolhimento, assinale a alternativa INCORRETA.
- (A) Pacientes com rebaixamento do nível de consciência ou alteração do estado mental são classificadas como amarelo.
 - (B) Nas maternidades e em serviços de saúde que realizam partos, a adequação da ambiência refere-se a reformas em seus espaços físicos com o objetivo de qualificá-los para favorecerem e facilitarem os processos e as relações de trabalho.
 - (C) O acolhimento da mulher e do acompanhante tem função fundamental na construção de um vínculo de confiança com os profissionais e os serviços de saúde, favorecendo seu protagonismo especialmente no momento do parto.
 - (D) O acolhimento é decisivo não só no reconhecimento de condições clínicas urgentes como também na potencialização da vivência do parto e do nascimento, experiência única na vida da mulher e de sua família.
- 12.** Toda paciente em trabalho de parto prematuro deve iniciar profilaxia contra infecção do *Streptococcus* β -hemolítico do Grupo B. Assinale o medicamento de primeira escolha prescrito.
- (A) Amoxicilina.
 - (B) Ciprofloxacino.
 - (C) Cefazolina.
 - (D) Norfloxacino.
- 13.** Hipertensão sem proteinúria, após 20 semanas de gravidez, cujos níveis tensionais retornam ao normal 6 a 12 semanas pós-parto:
- (A) pré-eclâmpsia sem gravidade.
 - (B) pré-eclâmpsia grave.
 - (C) hipertensão gestacional.
 - (D) hipertensão arterial crônica.
- 14.** Sinal que indica que a mulher se encontra em trabalho de parto ativo:
- (A) perda do tampão mucoso.
 - (B) ruptura da bolsa.
 - (C) contrações de Braxton Hicks.
 - (D) dilatação total do colo.
- 15.** Sangramento discreto ou ausente, frequentemente assintomático, colo impérvio e útero menor do que o esperado para a idade gestacional são características de qual intercorrência?
- (A) Abortamento inevitável.
 - (B) Abortamento retido.
 - (C) Ameaça de abortamento.
 - (D) Abortamento incompleto.
- 16.** São considerados cuidados de Enfermagem ao RN realizados no Alojamento Conjunto, **EXCETO**:
- (A) testar a sucção do recém-nascido.
 - (B) orientar a puérpera sobre a importância da amamentação e da frequência das mamadas.
 - (C) auxiliar a puérpera quanto ao posicionamento e à pega do recém-nascido durante a amamentação.
 - (D) acomodar o recém-nascido em decúbito ventral (posição prona) em berço previamente arrumado.
- 17.** Acerca dos cuidados individualizados ao RN na sala de parto, assinale a alternativa CORRETA.
- (A) Em RNs com boa vitalidade, evitar o clameamento oportuno do cordão umbilical.
 - (B) Nos recém - nascidos, pré-termos tardios, colocá-los primeiro em contato pele a pele, se mantiverem boa vitalidade.
 - (C) Nos RNs com idade gestacional abaixo de 36 semanas e/ou sem boa vitalidade, seguir as “Diretrizes da Reanimação Neonatal do PRN SBP”.
 - (D) Proceder à identificação do RN, com o uso de pulseira com nome completo da mãe, número de registro e informações do nascimento do RN. A mãe deverá receber pulseira semelhante.
- 18.** Acerca dos métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto, segundo as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, assinale a alternativa CORRETA.
- (A) A hipnose pode ser oferecida às mulheres que desejarem usar essa técnica durante o trabalho de parto, se houver profissional habilitado para tal.
 - (B) Por se tratar de intervenções não invasivas e sem descrição de efeitos colaterais, deve-se coibir as mulheres que desejarem usar audioanalgesia e aromaterapia durante o trabalho de parto.
 - (C) Os métodos não farmacológicos de alívio da dor devem ser oferecidos à mulher antes da utilização de métodos farmacológicos.
 - (D) A injeção de água estéril deve ser usada para alívio da dor no parto.
- 19.** São condutas contraindicadas de rotina de assistência ao parto, **EXCETO**:
- (A) soro com ocitocina.
 - (B) manobra de Leopold.
 - (C) raspagem dos pelos pubianos.
 - (D) jejum total.

20. O período de incubação da COVID-19, tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas, é, em média, de 5 a 6 dias, no entanto, as manifestações clínicas podem surgir entre o primeiro e o décimo quarto dia após a exposição. Assinale a alternativa CORRETA sobre a COVID-19.

- (A) Durante o período "pré-sintomático", algumas pessoas infectadas podem transmitir o vírus, o que ocorre, em geral, a partir de 24 horas antes do início dos sintomas.
- (B) Evidências recentes demonstram que a transmissão por contato em superfícies contaminadas (conhecidas como fômites) é provável de ocorrer quando os procedimentos de limpeza e as precauções padrão são aplicados.
- (C) Idosos podem apresentar um quadro diferente de sinais e de sintomas do apresentado pelas populações mais jovens, como não apresentar febre, evoluir com hipotermia, confusão mental ou apresentar quedas da própria altura.
- (D) As evidências científicas recentes indicam que essas novas variantes se espalham lentamente do que outras variantes.

21. Recém-nascido do sexo masculino, com peso de nascimento de 4650 gramas. Sua mãe era hipertensa e diabética e realizou seis consultas de pré-natal. Em relação a esse recém-nascido, foram evidenciados os seguintes sinais e sintomas de tremores, irritabilidade, sucção débil e letargia. Assinale o distúrbio mais provável conforme o quadro apresentado.

- (A) Hipoglicemia.
- (B) Hipotermia.
- (C) Hipocalcemia.
- (D) Policitemia.

22. "Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente" descreve qual conceito-chave da Classificação Internacional de Segurança do Paciente?

- (A) Incidente.
- (B) Risco.
- (C) Near miss.
- (D) Evento adverso.

23. "Cirurgias Seguras Salvam Vidas" é uma iniciativa multifacetada, participativa, para reduzir os danos ao paciente por meio da assistência cirúrgica mais segura. Nesse cenário, cada membro da equipe deve estar atento às suas atribuições. Assinale a alternativa que contém ações do técnico de enfermagem para cirurgia segura.

- (A) Avaliar o paciente e demarcar sítio cirúrgico quando aplicável.
- (B) Avaliar o risco de tromboembolismo venoso e, quando necessário, solicitar a reserva de prevenção mecânica com o uso de botas pneumáticas.
- (C) Realizar avaliação inicial com verificação e registro dos sinais vitais e controle de glicemia capilar.
- (D) Extubar o paciente quando o anestesiológista assim solicitar, evitando complicações.

24. Conforme orientações do Ministério da Saúde, a Vacina Hepatite B deve ser administrada em recém-nascidos pela via:

- (A) subcutânea.
- (B) intradérmica.
- (C) intramuscular.
- (D) intradérmica ou subcutânea.

25. A terapia anticonvulsivante é indicada para prevenir convulsões recorrentes em mulheres com eclâmpsia, assim como o aparecimento de convulsões naquelas com pré-eclâmpsia. Assinale a droga utilizada nessas situações.

- (A) Sulfato de magnésio.
- (B) Gluconato de cálcio.
- (C) Hidróxido de magnésio.
- (D) Metildopa.

26. Puérpera pós-parto cesárea, internada no alojamento conjunto tem a seguinte prescrição para ser administrada, se dor: Paracetamol 500mg, VO. Na farmácia tem disponível, somente, frasco gotas, 200mg/mL. Para atender corretamente à prescrição, quantas gotas serão necessárias?

- (A) 25.
- (B) 40.
- (C) 50.
- (D) 60.

27. Acerca das infecções sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O maior risco de transmissão do vírus do herpes acontece no momento da passagem do feto pelo canal de parto.
- (B) Recomenda-se a realização de cesariana sempre que houver lesões herpéticas ativas.
- (C) O aleitamento materno é a principal via de transmissão vertical da infecção pelo vírus HTLV.
- (D) Todos os RN nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis durante a gestação, independentemente do histórico de tratamento materno, deverão realizar teste treponêmico no sangue periférico.

28. O técnico de enfermagem pode realizar o banho dos recém-nascidos, porém existem alguns cuidados. São contra-indicações para o banho de imersão na banheira/bacia, **EXCETO**:

- (A) RN com peso $\geq 3.500g$.
- (B) RN com riscos de instabilidades clínica e/ou térmica.
- (C) RN menor que 34 semanas.
- (D) RN em uso de dispositivos invasivos (exemplos: cateter umbilical, cateter venoso periférico/central, drenos).

29. O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a Enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Qual resolução aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem?

- (A) RESOLUÇÃO COFEN Nº 612/2019.
- (B) RESOLUÇÃO COFEN Nº 557/2017.
- (C) RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017.
- (D) RESOLUÇÃO COFEN Nº 623/2019.

30. Fármaco de primeira escolha utilizado na inibição do trabalho de parto:

- (A) Ocitocina.
- (B) Nifedipina.
- (C) Hidralazina.
- (D) Metildopa.