

**01.** Segundo a Lei nº 7.498, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, julgue as afirmativas abaixo.

( ) A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.

( ) Cabe, como atividade privativa do enfermeiro, a consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de saúde.

( ) Como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro tem como função a execução do parto sem distocia.

( ) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.

Está correto de cima para baixo, a seguinte sequência:

(A) V, V, F, F.

(B) V, F, V, F.

(C) F, V, F, V.

(D) F, F, V, V.

**02.** O profissional de enfermagem comprometido com sua prática atua com autonomia e com base nos princípios éticos e legais com o objetivo de prestar uma assistência integral e diversificada. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, marque a alternativa que trata de um DIREITO do profissional de enfermagem.

(A) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.

(B) Estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos profissionais de Enfermagem sob sua supervisão e coordenação.

(C) Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de Enfermagem.

(D) Aplicar o processo de Enfermagem como processo metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.

**03.** O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes em que se desenvolve o cuidado de Enfermagem. Acerca dessa temática, marque o item correto.

(A) O Processo de Enfermagem organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.

(B) A etapa responsável pela realização das intervenções planejadas denomina-se Planejamento de Enfermagem.

(C) Diagnóstico de Enfermagem é a etapa de interpretação e agrupamento dos dados coletados que culmina com a tomada de decisão do enfermeiro.

(D) O Processo de Enfermagem é deliberado sistemático e pontual de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde/doença.

**04.** A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma das principais intercorrências que acometem os pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sobre essa temática marque o item correto.

(A) Os ritmos que se utilizam o Desfibrilador Externo Automático (DEA) para aplicação do choque são Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso.

(B) Apesar de ser mais difícil de ser utilizada, a via intraóssea deve, preferencialmente, ser utilizada para administração de medicamentos.

(C) A carga inicial do choque bifásica para desfibrilação deve ser de 360J.

(D) A hipovolemia, hipóxia e hipotermia são consideradas causas irreversíveis de uma PCR.

**05.** O sucesso da reversão de uma parada cardiorrespiratória (PCR) em adultos depende não só da causa se reversível ou não, mas também da qualidade da reanimação cardiopulmonar (RCP) que estão descritas nos itens abaixo, com **EXCEÇÃO** de qual afirmativa?

(A) A compressão torácica deve ser no mínimo de 5 cm, com retorno total do tórax.

(B) A frequência cardíaca deve ser de pelo menos 100 bpm e máximo de 120 bpm.

(C) Quando não há via aérea avançada, a relação compressão/ventilação deve ser de 30:2.

(D) A pressão parcial de CO<sub>2</sub> ao final da expiração (PETCO<sub>2</sub>) em queda significa uma boa qualidade das manobras de RCP.

**06.** A prevenção da Infecção do Trato Urinário (ITU) é uma das responsabilidades do enfermeiro no contexto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), visando ao não agravamento desses pacientes. Acerca da técnica de inserção do cateter urinário, segundo a ANVISA 2017, marque o item correto.

(A) Realizar a antisepsia da região perineal com solução padronizada, partindo da periferia para a uretra.

(B) Introduzir gel lubrificante na uretra em homens.

(C) Lubrificar um pouco mais da metade da sonda com gel lubrificante em mulheres.

(D) Fixar corretamente o cateter na raiz da coxa no sexo masculino e no hipogástrio nas mulheres, evitando traumas.

**07.** A Biossegurança é definida como um conjunto de medidas voltadas para prevenção, diminuição ou eliminação de riscos inerentes às atividades que possam comprometer à saúde do homem, dos animais e do meio ambiente. Esses riscos ambientais podem ser classificados de acordo com cores. Assinale a alternativa que correlaciona o tipo de risco com a sua cor adequada.

(A) Risco biológico – marrom.

(B) Risco físico – azul.

(C) Risco químico – verde.

(D) Risco ergonômico – vermelho.

**08.** O atendimento ao paciente com suspeita de COVID-19 exigiu total atenção do profissional enfermeiro para a paramentação e desparamentação dos equipamentos de proteção individual, uma vez que esse é momento de grande risco de contaminação. Marque o item que dispõe a sequência correta, segundo a ANVISA.

- (A) Luvas, máscara, avental e óculos.
- (B) Avental, máscara, luvas, óculos.
- (C) Higienização das mãos, avental, máscara, óculos, luvas.
- (D) Lavagem das mãos, avental, máscara, luvas, óculos.

**09.** Uma das principais causas de complicações do paciente internado em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) está relacionada com as disfunções do sistema cardiovascular. Dessa forma, o enfermeiro deve ter bom conhecimento da fisiologia cardiovascular para garantir uma assistência de enfermagem qualificada. Acerca dessa temática, marque o item correto.

- (A) O débito cardíaco (DC) representa a quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo e pode ser mensurada multiplicando o volume sistólico (VS) e a pressão arterial (PA).
- (B) O fluxo sanguíneo bombeado para o corpo sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e chega ao átrio direito pelas veias cavas inferiores e superiores, passando pela válvula mitral, chegando ao ventrículo direito.
- (C) O sistema de condução elétrica do coração se inicia no nó sinoatrial, percorrendo a seguinte sequência: nó atrioventricular, Feixe de His, Ramo direito e esquerdo do Feixe de His e Fibras de purkinge.
- (D) A atividade elétrica do coração pode ser avaliada pelo eletrocardiograma, indicando uma alteração patológica quando se tem um ritmo sinusal.

**10.** A enfermagem cirúrgica tem como principal objetivo a prevenção de complicações cirúrgicas, promovendo recuperação e reabilitação o mais breve possível. Para tal, a limpeza do centro cirúrgico é uma etapa de extrema importância. A limpeza realizada no término de cada cirurgia é definida como:

- (A) limpeza concorrente.
- (B) limpeza diária.
- (C) limpeza terminal.
- (D) limpeza preparatória.

**11.** O paciente em estado crítico, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), frequentemente está em uso de ventilação mecânica invasiva por meio do tubo endotraqueal, a fim de garantir o suporte ventilatório. Acerca desse assunto, marque o item correto.

- (A) Os ventiladores mecânicos podem ser ciclados a dois tipos: volume ou pressão.
- (B) Dentre os parâmetros que podem indicar a necessidade de suporte ventilatório está a frequência respiratória maior do que 30 rpm.
- (C) O ciclo ventilatório durante a ventilação mecânica com pressão positiva pode ser dividido em: 1. Fase inspiratória; 2. Ciclagem; 3. Fase expiratória e; 4. Disparo.
- (D) O volume corrente é definido como a quantidade de ar que permanece nos pulmões após uma expiração forçada.

**12.** Em caso de intoxicação causada por opioide, qual antagonista específico deve ser utilizado?

- (A) Glucanato de sódio.
- (B) Protamina.
- (C) Flumazenil.
- (D) Naloxona.

**13.** A prescrição médica indica a administração de soro glicosado a 8% de 250 ml para ser infundido de 12/12 horas. No entanto, a unidade hospitalar só possui disponível frascos de 250 ml a 5% e ampolas de 20 ml a 50%. Qual a quantidade necessária de ml a 50% que deve ser acrescida para atender à prescrição médica?

- (A) 0,75 ml.
- (B) 7,5 ml.
- (C) 15 ml.
- (D) 20 ml.

**14.** Para administração de uma droga vasoativa foi prescrito a vazão de 120 ml em 30 min. Essa prescrição equivale em gotas por minuto:

- (A) 1,3.
- (B) 40.
- (C) 60.
- (D) 80.

**15.** Paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com diagnóstico de Insuficiência Renal Aguda apresentou gasometria arterial com os seguintes parâmetros: pH = 7,3; pCO<sub>2</sub> = 53; HCO<sub>3</sub> = 24. Trata-se de qual distúrbio metabólico?

- (A) Acidose metabólica.
- (B) Acidose respiratória.
- (C) Alcalose metabólica.
- (D) Alcalose respiratória.

**16.** Paciente adulto, vítima de uma colisão frontal de carro, apresenta abertura ocular ao chamado, encontra-se confuso e resposta motora com flexão anormal. A pontuação desse paciente de acordo com a escala de coma de Glasgow é:

- (A) 7.
- (B) 8.
- (C) 9.
- (D) 10.

**17.** O choque é um estado de falência circulatória, o que leva a um quadro de hipoperfusão tecidual dos principais órgãos do corpo. Assim, deve ser reconhecido precocemente pelo enfermeiro com o objetivo de evitar desfechos traumáticos. Marque o item correto acerca da assistência de enfermagem nos diferentes tipos de choque.

- (A) No choque hipovolêmico a reposição volêmica deve ser realizada o mais brevemente possível e a droga vasoativa de escolha é a Dobutamina.
- (B) Dentre as funções do enfermeiro na assistência ao paciente com choque séptico está o aprazamento o mais precocemente do antibiótico prescrito.
- (C) No choque cardiogênico há uma disfunção miocárdica com perda da sua função circulatória e recomenda-se a Nitroglicerina como droga de escolha para reversão desse quadro.
- (D) O paciente encontra-se com a pele fria, úmida e pegajosa no choque neurogênico.

**18.** O Acidente Vascular Encefálico (AVE) isquêmico é o tipo mais frequente, com cerca de 85% dos casos, e se caracteriza pela interrupção do fluxo sanguíneo arterial em uma determinada região do cérebro. A trombólise endovenosa deve ser oferecida para todos os pacientes com cautela e apresenta vários critérios de exclusão, com **EXCEÇÃO** de:

- (A) história pregressa de hemorragia intracraniana ou de malformação vascular cerebral.
- (B) déficits neurológicos leves (sem repercussão funcional significativa).
- (C) hemorragia geniturinária ou gastrointestinal nos últimos 21 dias ou história de varizes esofagianas.
- (D) glicemia < 70 mg/dl com reversão dos sintomas após a correção.

**19.** Os vasopressores são potentes agentes farmacológicos usados para elevar a pressão arterial (PA) por diversos mecanismos. Definida como catecolamina endógena e um precursor metabólico da norepinefrina e da epinefrina que atua sobre os receptores dopaminérgicos,  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$  e  $\beta_2$  de uma forma dependente da dose. Tal descrição trata-se de qual droga?

- (A) Noradrenalina.
- (B) Dobutamina.
- (C) Dopamina.
- (D) Epinefrina.

**20.** O Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) é uma forma de determinar o grau de dependência de um paciente em relação à equipe de enfermagem, com o objetivo de estabelecer o tempo despendido no cuidado direto e indireto. De acordo com essa temática, julgue os itens a seguir.

- ( ) Pacientes de cuidados mínimos são estáveis e requerem 1 profissional para 8 pacientes.
- ( ) Pacientes de cuidados intermediários possuem dependência parcial, são estáveis e o dimensionamento é de 1 profissional para 4 pacientes.
- ( ) Pacientes de cuidados intensivos são graves com risco iminente de morte, despendendo de 18 horas da equipe de enfermagem.
- ( ) Pacientes de cuidados semi-intensivos necessitam de 36% de enfermeiros, sendo necessário 10 horas de cuidados.

Marque a alternativa correta de cima para baixo.

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.

**21.** O dimensionamento da equipe de enfermagem é de extrema importância para garantir a qualidade do cuidado dos pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A porcentagem mínima do Índice de Segurança Técnica (IST) é:

- (A) 10%.
- (B) 15%.
- (C) 20%.
- (D) 25%.

**22.** A estrutura física de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deve seguir o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde disposto na resolução da Anvisa RDC 50/2002. De acordo com essa resolução, marque o item correto sobre a estrutura física de uma UTI.

- (A) A avaliação do Projeto Básico de Arquitetura (PBA) de uma UTI é realizada por uma equipe composta somente por profissionais médicos.
- (B) A unidade de terapia intensiva, os centros cirúrgicos e obstétricos devem ser atendidos pela tubulação principal da rede de distribuição, devendo ser instalada uma válvula de seção à montante do painel de alarme de emergência específico de cada uma dessas unidades.
- (C) A luminosidade deve ser direcionada para atender os profissionais em suas necessidades, não sendo uma preocupação para o conforto de pacientes.
- (D) A distância entre os leitos de UTI deve ser adequada para facilitar a circulação dos profissionais, mas podem ter reajustes ficando até 90 cm de distância um do outro.

**23.** A vigilância epidemiológica tem como objetivo promover a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica. Dessa forma, no contexto de uma UTI compreender os indicadores de saúde é de extrema importância para o planejamento das ações e melhoria da qualidade do cuidado do paciente crítico. Acerca dessa temática, marque a alternativa correta.

- (A) A medida de novos casos de infecção por *Klebsiella pneumoniae* em pacientes internados na UTI em um curto período de tempo denomina-se prevalência.
- (B) O número total de casos de SARS-CoV-2 internados em uma UTI no ano de 2021 é denominado incidência.
- (C) O aumento inesperado do número de casos de gastroenterite de pacientes internados em uma UTI devido à contaminação da dieta enteral denomina-se de surto.
- (D) O número de mortes relacionadas à internação por SARS-CoV-2 em uma UTI é calculado pelo número de óbitos causados pela doença dividido pela população exposta ao risco.

**24.** As teorias de enfermagem são suporte para o desenvolvimento do Processo de Enfermagem, orientando desde a coleta de dados até a avaliação dos resultados alcançados. A teoria que ressalta que a pessoa, como um sistema, possui a capacidade de se adaptar e criar mudanças no meio ambiente e ressalta a relação dos conceitos de Enfermagem, saúde/doença, ambiente e pessoa é:

- (A) Teoria da Adaptação.
- (B) Teoria Humanística.
- (C) Teoria do Cuidado Interpessoal.
- (D) Teoria das Necessidades Humanas Básicas.

25. A assistência de enfermagem ao paciente crítico internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exige atenção 24 horas por parte da equipe de saúde, em virtude das intercorrências (urgências/emergências) que podem acometer o paciente. Síndrome que acarreta nos quadros iniciais taquicardia, taquidispnéia e estertores nas bases de ambos os pulmões, podendo evoluir para dispnéia acentuada, ansiedade e agitação, palidez, sudorese fria, cianose de extremidades e estertoração em todos os campos pulmonares é:

- (A) edema agudo de pulmão.
- (B) acidose metabólica descompensada.
- (C) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- (D) crise asmática.

26. O cateterismo cardíaco é um exame invasivo que pode ser realizado de forma eletiva ou em situações de emergência para confirmar a presença de obstruções das artérias coronárias ou avaliar o funcionamento das valvas e do músculo cardíaco. Para tal, faz-se necessária a preparação e acompanhamento do paciente pela equipe de enfermagem. Em casos de cateterismo eletivo, marque o item que **NÃO** é um cuidado de enfermagem voltado para esses pacientes.

- (A) Investigar se o paciente possui alergias a contraste de iodo, látex e mariscos devido ao risco de reação anafilática que pode ocorrer durante o procedimento.
- (B) Identificar se o paciente está sendo medicado com anticoagulantes, aspirina ou qualquer medicação não esteroidal, pois tais medicamentos aumentam o risco de sangramento.
- (C) Avaliar a função renal do paciente por meio de eletrólitos, níveis de ureia e creatinina sanguíneas com o objetivo de avaliar função renal.
- (D) Determinar e documentar o tempo da última ingesta de líquido ou alimento, sendo contraindicado caso o paciente não esteja em jejum de 12 horas.

27. A monitoração em unidade de terapia intensiva (UTI) é obrigatória e imprescindível na assistência ao paciente e, portanto, o enfermeiro intensivista deve ter conhecimento específico para utilização da tecnologia necessária. Dentre os parâmetros avaliados está a Pressão Venosa Central (PVC). Sobre esse parâmetro, marque o item correto.

- (A) A PVC é o termo usado para descrever a pressão exercida em veia cava superior e inferior durante o retorno venoso na circulação sistêmica e só pode ser mensurada a cada 6 horas.
- (B) A instalação e verificação da PVC não apresenta riscos para o paciente, uma vez que a medida é totalmente não invasiva.
- (C) O nivelamento na montagem da PVC é realizado identificando-se o eixo flebostático ou zero fisiológico, referência para o ponto médio atrial.
- (D) A técnica de mensuração da pressão recomenda que o paciente deve ser mantido em posição horizontal. Caso não seja possível, a PVC pode ser verificada na posição semideitada, sem necessidade de zerar o sistema quando a cabeceira do leito tiver sido alterada.

28. A implantação e implementação da Comissão Hospitalar de Organização e Qualificação da Atenção ao Paciente Crítico (COHPAC) é obrigatória junto a Estabelecimentos de Saúde detentores de Unidades Assistenciais em Terapia Intensiva. Julgue os itens como verdadeiro ou falso.

( ) O objetivo principal das COHPAC está vinculado à implementação de processos que permitam o acompanhamento sistemático do paciente crítico junto aos diversos equipamentos hospitalares de atenção ao paciente de acordo com suas necessidades.

( ) A composição mínima dessa comissão é formada por um diretor e um representantes médico das Unidades Assistenciais em Terapia Intensiva.

( ) Dentre as atribuições mínimas está elaborar e implementar o Plano Hospitalar de Atenção ao Paciente Crítico.

( ) A comissão não é responsável por implementar o Plano Hospitalar de Atenção ao Paciente Crítico, mas sim de acompanhar as metas traçadas para melhorar a qualificação do serviço.

Marque o item que corresponde a sequência correta de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

29. Os registros de enfermagem são essenciais para a qualidade do cuidado o processo do cuidar, pois possibilitam uma comunicação segura entre os profissionais de enfermagem e a equipe de saúde, bem como tem como finalidade apoiar ações de ensino, pesquisa e esclarecimento de processos éticos e judiciais. Acerca dessa temática, marque o item correto.

- (A) A responsabilidade do profissional que realizou o registro poderá ocorrer no âmbito ético, legal, administrativo, cível e criminal.
- (B) Os registros, como documento legal, terão valor mesmo se não forem datados e assinados, mas precisam ser legíveis e não apresentar rasuras.
- (C) Os registros devem conter informações parciais e pertinentes para a continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas.
- (D) A anotação de enfermagem é privativa do enfermeiro e refere ao período de 24 horas.

30. A responsabilidade do Enfermeiro como líder e agente de mudança nos cenários de saúde é de extrema importância para a continuidade e qualidade do cuidado, sobretudo em locais que geram uma grande carga física e emocional para a equipe de enfermagem como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Um enfermeiro-chefe que trabalha em cima de metas, assegurando que a equipe cumpra as regras e que fornece uma folga trimestral para aqueles funcionários que não possuem falta. Trata-se de um líder:

- (A) democrático.
- (B) transformacional.
- (C) transacional.
- (D) autocrático.