

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Sobre o Suporte de Vida prestado à vítima em via pública, é **CORRETO** afirmar.

- (A) Ao chegar ao local onde há uma vítima de atropelamento, a equipe deve primeiramente garantir a permeabilidade das suas vias aéreas.
- (B) A compressão direta do sangramento está indicada em casos de sangramentos externos visíveis observados durante a avaliação inicial.
- (C) Em casos de parto em via pública, sempre cobrir completamente o recém-nascido, deixando a cabeça descoberta, para melhorar a oxigenação, e observar seu choro.
- (D) Atendendo um coronariopata com dor no peito que teve um mal súbito, a conduta mais importante é manter as vias aéreas desobstruídas.

02. A Central de Regulação passa para você um caso de um paciente idoso com febre e dispneia intensa. O atendimento do idoso começa com:

- (A) a oferta de oxigenioterapia em alto fluxo, para elevação de seus níveis de saturação de oxigênio.
- (B) a avaliação do nível de consciência e a permeabilidade das vias aéreas do idoso.
- (C) a solicitação de autorização à Central de Regulação para realizar a oxigenioterapia do paciente após certificar-se de sua real necessidade.
- (D) o certificar-se sobre os riscos inerentes ao local e à abordagem do paciente.

03. Sobre a oferta de oxigenioterapia em pacientes suspeitos de COVID-19, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) pacientes com saturação abaixo de 95% em ar ambiente são considerados críticos e necessitam de suporte avançado de vida.
- (B) o uso do cateter nasal para oxigenioterapia não está indicado em pacientes suspeitos de COVID-19.
- (C) crianças com retração intercostal, batimento da asa do nariz e bradipneia são consideradas graves e necessitam de maiores fluxos de oxigenioterapia.
- (D) o uso de máscara cirúrgica está indicado como equipamento de proteção individual (EPI), para a equipe, em todos os casos de necessidade de oxigenioterapia.

04. Sobre o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), a ordem preconizada de paramentação é:

- (A) avental, máscara, protetor ocular, gorro e luvas.
- (B) máscara, macacão impermeável, avental, gorro, protetor facial e luvas.
- (C) gorro, protetor ocular, máscara, avental e luvas.
- (D) avental, luvas, máscara, gorro e proteção facial.

05. Após atendimento a um paciente portador de COVID-19, o profissional do atendimento pré-hospitalar, ao se desparamentar, deve:

- (A) retirar seu EPI na ordem inversa à da paramentação.
- (B) desparamentar-se dentro de sua ambulância.
- (C) solicitar supervisão durante todo o processo de desparamentação.
- (D) trocar de luvas antes de iniciar sua desparamentação.

06. No atendimento a um paciente psiquiátrico em surto psicótico, vítima de COVID-19, é **CORRETO** afirmar.

- (A) A contenção física é um procedimento de alto risco de contaminação para a equipe.
- (B) A equipe deve barganhar como forma de convencimento, mesmo que não possa cumprir o prometido, pois o objetivo é não realizar a contenção física.
- (C) Pelo alto risco de contaminação, a equipe deve sempre abordar o paciente utilizando macacão impermeável, máscara N95 e protetor facial.
- (D) A comunicação terapêutica fica limitada devido à necessidade de distanciamento do paciente como precaução de contaminação pelo vírus da COVID-19.

07. A reanimação cardiopulmonar em pacientes com COVID-19 é considerada como procedimento gerador de aerossol. As precauções adicionais preconizadas para equipe são, **EXCETO**:

- (A) utilizar uma segunda máscara como equipamento adicional de proteção individual.
- (B) proteger a via aérea do paciente, para evitar o retorno de ar aerossolizado.
- (C) evitar realizar ventilação manual com dispositivo bolsa-valva-máscara.
- (D) oferecer oxigenioterapia sob máscara não reinalante sem pressão positiva.

08. No atendimento a incidentes com múltiplas vítimas de origem traumática, é **INCORRETO** afirmar.

- (A) As ações conhecidas como “3S” da segurança devem ter prioridade nesse atendimento.
- (B) Em cena insegura, o profissional deve efetuar rápida triagem dos pacientes para rápida remoção da cena.
- (C) Se a situação epidemiológica for de transmissão comunitária para COVID-19, considerar todas as vítimas como portadoras da doença.
- (D) O primeiro respondedor a chegar no local tem importância fundamental na gestão do incidente.

09. Sobre os princípios doutrinários do SUS em tempo de pandemia, considere as assertivas abaixo e marque o item **CORRETO**.

- (A) Em tempos de pandemia, fronteiras podem ser fechadas e somente têm direito à saúde no Brasil os brasileiros natos e naturalizados, e estrangeiros que estejam de forma regular no país.
- (B) O princípio da regionalização diz que as pessoas só podem ser atendidas nas proximidades de sua residência, dentro das regionais de Fortaleza.
- (C) Como cada caso de COVID-19 é diferente, com necessidades diferentes, devemos atender e tratar todos de forma diferente, de forma que as necessidades de saúde individuais sejam contempladas na sua exata medida.
- (D) O direito ao atendimento integral, para pacientes de COVID-19, encerra-se quando toda a capacidade de resposta do sistema fica menor do que a demanda de atendimento.

10. No transporte de pacientes vítimas de COVID-19, é CORRETO afirmar.

- (A) O paciente e ambulância necessariamente devem estar “envelopados”, com o paciente em “maca bolha” e todas as superfícies da ambulância protegidas.
- (B) A aspiração das vias aéreas, quando necessária, só deve ser feita com o paciente fora da ambulância.
- (C) O condutor da ambulância, por não ser profissional oriundo da saúde, deve se eximir do contato com o paciente.
- (D) O transporte do paciente com COVID-19 deve ser feito com equipe totalmente paramentada para proteção de contaminação por aerossóis e gotículas.

11. Você presencia o parto iminente de um bebê do sexo masculino, em domicílio, em posição pélvica. Marque a opção CORRETA.

- (A) Você coloca a mãe em posição genupeitoral, comunica à Central de Regulação e realiza a assistência ao parto.
- (B) Você coloca a mãe em decúbito lateral esquerdo e aguarda orientação da Central de Regulação.
- (C) Você coloca a mãe em decúbito dorsal, espera a saída de todo o corpo e realiza a Manobra de Bracht para desprendimento da cabeça.
- (D) Você coloca a mãe dentro da ambulância e remove para a maternidade mais próxima.

12. Marque a alternativa que contém as informações importantes sobre a assistência ao recém-nascido que nasce bem.

- (A) É importante avaliar a sua frequência cardíaca palpando o pulso carotídeo.
- (B) É importante aspirar boca e nariz, mesmo que não tenham secreções perceptíveis.
- (C) É importante clampar o cordão umbilical o mais breve possível.
- (D) É importante avaliar seu tônus muscular, sua respiração e sua idade gestacional.

13. Ao abordar uma gestante em trabalho de parto, o condutor deve:

- (A) realizar normalmente a avaliação primária e secundária.
- (B) inspecionar a vulva em busca de partes fetais ou perdas líquidas.
- (C) palpar seu abdômen para saber a apresentação fetal.
- (D) preparar para transporte em decúbito lateral direito.

14. Nos casos de paciente vítima de contaminação por produtos químicos por qualquer via, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Induzir vômitos reduz a quantidade de produtos ingerida, atenuando seus efeitos.
- (B) Não cortar nem remover as vestes pelo perigo de aumentar a contaminação.
- (C) Em casos de contaminação dos olhos, lavar com água abundante da lateral até o canto do olho (próximo ao nariz), por, no mínimo, 20 minutos.
- (D) Na contaminação respiratória, manter o paciente em local arejado, livre do produto químico, com oxigênio suplementar.

15. Sobre os dispositivos de oxigenioterapia, assinale o item CORRETO.

- (A) A máscara facial não reinalante com reservatório é indicada aos pacientes com importante desconforto respiratório que necessitam de altas concentrações de oxigênio.
- (B) O cateter de oxigênio é a primeira indicação em casos de dispneia em pacientes com COVID-19, por permitir altos fluxos de oxigênio quando necessário.
- (C) A máscara de Venturi é indicada na COVID-19 àqueles pacientes que precisam de um controle rigoroso da oferta de oxigênio.
- (D) Em pacientes conscientes com dispneia leve, o uso da cânula orofaríngea junto do cateter de oxigênio é uma excelente combinação.

16. Sobre o método ACENA, de avaliação do ambiente, do paciente e da segurança, podemos afirmar que:

- (A) no ACENA, a primeira ação é distensionar as situações de raiva, medo e euforia do paciente.
- (B) o ‘C’ do mnemônico ACENA nos lembra que a Comunicação Terapêutica é a melhor “ferramenta” em todos os casos.
- (C) o ‘N’ do mnemônico ACENA nos lembra a importância de avaliar o “Nível de Consciência” e o “Nível de Sofrimento” do paciente.
- (D) o mnemônico ACENA nos lembra a avaliação primária, a comunicação terapêutica, a segurança da equipe, o nível de consciência e a agressividade do paciente.

17. Sobre o atendimento de urgência ao paciente psiquiátrico armado, assinale a opção CORRETA.

- (A) Abordar inicialmente o paciente utilizando EPI apropriados, como capacete e escudo.
- (B) Informar imediatamente o caso ao médico regulador, solicitando apoio especializado.
- (C) Na presença de armas de fogo, assumir a mediação utilizando frases curtas e simples, e repetindo propostas.
- (D) Sempre se deve evitar a presença policial dentro da ambulância, pois esta leva a situações de medo e raiva que descompensam o estado emocional do paciente.

18. Sobre o Suporte Básico de Vida, assinale a opção CORRETA.

- (A) A urgência hipertensiva é mais grave que a simples emergência, podendo levar, inclusive, a um Acidente Vascular Cerebral.
- (B) Na crise convulsiva generalizada tônico-clônica do paciente epilético, nunca suspeitar de Acidente Vascular Cerebral.
- (C) No paciente diabético, sudorese, palidez, taquicardia, tontura e tremores são sintomas clássicos de hiperglicemia.
- (D) Diarreia, vômitos e dispneia podem ser sinais e sintomas de reação anafilática, se houver história de provável exposição ao alérgeno.

19. Sobre a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), escolha a alternativa CORRETA.

- (A) As equipes de saúde da família e equipes de agentes comunitários de saúde fazem parte da PNAU e são importantes no acolhimento inicial da demanda espontânea.
- (B) A PNAU foi instituída pelo Ministério da Saúde através da Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.
- (C) A Força Municipal do SUS está prevista na Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 2012, como um componente humanitário do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A Portaria GM/MS nº 1.863, de 29 de setembro de 2003, prevê que as capacitações de todos os componentes da Rede de Urgência e Emergência sejam realizadas por meio dos Núcleos de Educação em Urgência (NEU).

20. Sobre as regras gerais de condução da ambulância, assinale o item CORRETO.

- (A) O condutor, em situações de congestionamento, deve evitar abrir espaço pelo centro da via e fazê-lo, sempre, pelo lado esquerdo da mesma.
- (B) Os profissionais de saúde, dentro de uma ambulância em deslocamento, não podem desfivelar seus cintos, devendo fazer todos os procedimentos necessários com os cintos afivelados.
- (C) A ambulância, mesmo com seus sinais sonoros e luminosos de emergência acionados, não tem preferência sobre os pedestres.
- (D) Para um retorno mais rápido à base descentralizada, o condutor pode fazer uso dos sinais sonoros e luminosos de emergência.